

- 出萼外,向喉部渐收缩,至喉部宽1.5毫米.....
87.短距香茶菜 *R. brevicealcarta* C. Y. Wu et H. W. Li
 89.叶具短柄,柄长0.2—1厘米;花冠筒基部上方浅囊状,向上等宽,至喉部宽约2毫米.....90.腺花香茶菜 *R. adenatha* (Diels) Hara

组1.香茶菜组——Sect. *Amethystoides* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 45. 1832; et in DC. Prodr. 12:61. 1848; Briq. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. 4,3a: 354. 1897, sub genus *Plectranthus* L' Herit.

果萼直立,钟形,具相等的5齿;花冠筒下曲,基部上方浅囊状;花序疏散圆锥状,由具梗开展的聚伞花序组成。

1. 显脉香茶菜 蓝花柴胡、大叶蛇总管(广西)

Rabdosia nervosa (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 13(1): 79. 1975——*Plectranthus nervosus* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 272. 1890, p. p. maj. excl. specim. Henry 2725, Carles 347; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 207. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 8: 157. 1913; in ibid. 6: 137, 143. 1915, excl. syn. *Teucrium mairei* Lévl.; Belval in Mus. Heude Notes Bot. Chin. 2: 99. 1933; 孙雄才, 科学社生物所论文集 7: 61. 1932, p.p.; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13: 367. 1939, in clavi——*Isodon nervosus* (Hemsl.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 123. 1929——*Plectranthus mosliifolius* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 247. 1911——*Plectranthus angustifolius* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 8: 154. 1913, p. p. quoad Wilson 2577——*Amethystanthus stenophyllus* Migo in Journ. Shangh. Sci. Inst., sect. 3, 3: 231. tab. III. 1937, non *Plectranthus stenophyllus* Bak. 1900——*Plectranthus salicarius* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13: 377. 1939——*Rabdosia stenophylla* (Migo) Hara in Journ. Jap. Bot. 47(7): 200. 1972——*Plectranthus stracheyi* auct. non Benth.: Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 9: 93. 1934.

多年生草本,高达1米;根茎稍增大呈结节块状,其上生出径1—3毫米的细根和多数纤细须根。茎自根茎生出,直立,不分枝或少分枝,四稜形,明显具槽,幼时被微柔毛,老时毛被脱落或变无毛。叶交互对生,披针形至狭披针形,长3.5—13厘米,宽1—2厘米,先端长渐尖,基部楔形至狭楔形,边缘有具胛尖尖的粗浅齿,侧脉4—5对,在两面隆起,细脉多少明显,薄纸质,上面绿色,沿脉被微柔毛,余部近无毛,下面较

淡,近无毛,脉白绿色;下部叶柄长 0.2—1 厘米,被微柔毛,上部叶无柄。聚伞花序(3) 5—9(15) 花,具长 5—8 毫米的总梗,于茎顶组成疏散的圆锥花序,花梗与总梗及序轴均密被微柔毛;苞片狭披针形,叶状,长 1—1.5 厘米,密被微柔毛,小苞片线形,长 1—2 毫米,密被微柔毛。花萼紫色,钟形,长约 1.5 毫米,外密被微柔毛,萼齿 5,近相等,披针形,锐尖,与萼筒等长,果时萼增大呈阔钟形,长 2.5 毫米,宽达 3 毫米,萼齿直伸,三角状披针形,与萼筒等长,齿间具宽圆凹。花冠蓝色,长 6—8 毫米,外疏被微柔毛,冠筒长 3—4 毫米,近基部上方成浅囊状,冠檐二唇形,上唇 4 等裂,裂片长圆形或椭圆形,下唇舟形,较上唇稍长,长约 4 毫米,椭圆形。雄蕊 4,二强,伸出花冠外,花丝下部疏被微柔毛。花柱丝状,伸出花冠外,先端相等 2 浅裂。花盘盘状。小坚果卵圆形,长 1—1.5 毫米,宽约 1 毫米,顶端被微柔毛。花期 7—10 月,果期 8—11 月。

产陕西,河南,湖北,江苏,浙江,安徽,江西,广东,广西,贵州及四川;生于山谷、草丛或林下荫处,海拔(60)300—600(1000)米。等模式标本采自上海,湖北宜昌、巴东,广东的北江。

茎叶入药,治急性传染性肝炎、毒蛇咬伤、脓疱疮、湿疹及皮肤搔痒等症。

Dunn (1915) 将 *Teucrium mairei* Lévl. 作为异名并入此种,我们虽未见到 Lévl. 所依据的采自云南东川的标本 (Maire 1615, 2483), 但根据 Lévl. 的原描写提到:“花萼小,齿短而钝,后反折”,不符合本种的特征,且目前未见有云南产本属标本符合本种特征,故应取消云南的记录。

2. 香茶菜(救荒本草) 铁稜角(浙江兰溪、衢县、乐清、杭州、泰顺),稜角三七、四稜角(浙江临安),铁角稜(浙江丽水、天台)铁丁角(浙江龙泉),铁龙角、铁钉头(浙江平阳),铁称锤(浙江乐清),石哈巴(本草纲目拾遗,浙江鄞县),铁生姜(浙江诸暨),蛇总管、山薄荷(广西河池),痲子草(福建龙溪)。

Rabdosia amethystoides (Benth.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 194. 1972——*Plectranthus amethystoides* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 45. 1832; in DC. Prodr. **12**: 61. 1848; Maxim. in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **9**: 424. 1875; Debx. in Act. Soc. Linn. Bordeaux **31**: 339. 1876—77; et in ibid. **33**: 93. 1879; Franch. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg **24**: 241. 1884; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 269. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 208. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 158. 1913; in ibid. **6**: 143. 1915; Merr. in Sunyatsenia **1**: 32. pl. 10. 1930; 孙雄才,科学社生物所论文集 **7**: 239. 1932; Belval in Mus. Heude