

疏柔毛,内面无毛,冠筒近等大,长约10毫米,宽约4毫米,基部上方浅囊状,冠檐二唇形,上唇外反,长6—7毫米,先端具4圆裂,下唇长6—7毫米,舟形。雄蕊4,二强,均下倾于下唇上,内藏。花柱丝状,先端近相等2浅裂。花盘环状。小坚果卵圆形,长约1.8毫米,宽1.5毫米,黄褐色,具紫色斑纹。花期7—8月,果期8—9月。

产云南西北部及四川西南部;生于砾石草地、林缘及松林中,海拔2650—3300米。模式标本采自云南丽江玉龙雪山东坡。

17b. 居间变种

var. *intermedia* C. Y. Wu et H. W. Li, 云南植物志 1: 768. 1976.

这一变种与原变种不同在于叶均菱状卵圆形,较大,近膜质,两面略被疏柔毛,叶柄长2.5—3.5厘米;萼齿三角状披针形,长2—3毫米,先端长渐尖。

产云南西北部;生于杂木林下,海拔3500米。模式标本采自云南鹤庆。

18. 露珠香茶菜

Rabdosia irrorata (Forrest ex Diels) Hara in Journ. Jap. Bot. 47(7):196. 1972
——*Plectranthus irroratus* Forrest ex Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh 5:228. 1912;
Dunn in ibid. 7:143. 1913, p. p.; Hand. Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13:365. in
clavi, 374. 1939——*Isodon irroratus* (Forrest ex Diels) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr.
Taihoku Univ. 2: 121. 1929.

18a. 露珠香茶菜(原变种) 图版 90: 6—7

var. *irrorata*

直立灌木,高0.3—1米;主根粗大,常不规则柱状,直立或平出,其上有细长的侧根,主根及侧根上均有纤细的须根。茎直立或斜上升,圆柱形,褐灰色,皮层纵向片状剥落,上部多分枝,分枝近圆柱形至钝四棱形,带紫色,被短柔毛。叶对生,枝下部的叶较小,中部的最大,向上部渐变小而呈苞片状,中部叶片卵形至阔卵形,长1.5—3厘米,宽1.3—2.5厘米,先端钝,基部阔楔形,除叶基1/3外边缘具圆齿,草质,上面深绿色,被白色短硬毛及满布淡黄色腺点,下面淡绿色,仅沿脉上疏被短硬毛,满布淡黄色腺点,侧脉3—4对,在两面尤其是在下面隆起;叶柄短,长1—2毫米。聚伞花序3—5花,多数组成长(6)10—15(20)厘米的圆锥花序;苞叶位于花序下部的与叶同形,向上渐变小,呈苞片状,卵形,全缘,两面满布腺点,边缘具短硬毛,小苞片线形,长1—2毫米;花梗长2—3毫米,与长1—1.5厘米的总梗均被腺毛。花萼常带紫色,稍下倾,宽钟形,长3—5毫米,外面沿脉上被短硬毛,其间散布淡黄色腺点,内面无毛,萼齿5,多少呈二唇形,披针状卵形,长1—1.5毫米,前2齿稍宽,果时花萼增大,长