

2 齿较长, 2 齿稍短, 第 5 齿短而外弯, 三角状披针形, 锐尖, 外面被细微柔毛, 内面被微柔毛, 花萼花后直立稍增大。花冠淡紫色, 较大, 长 1—1.2 厘米, 被微柔毛, 基部上方骤然浅囊状, 下唇近无毛, 四圆裂, 裂片近圆形, 基部稍收缩, 径约 2 毫米。雄蕊与花冠近等长, 前对雄蕊稍长。成熟小坚果未见。(标本未见, 摘自原描写)

产西藏东南部; 生于混交林中空地, 海拔 2700—3000 米。模式标本采自西藏东南部雅鲁藏布江谷地。

20. 苍山香茶菜

Rabdosia bulleyana (Diels) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7):194 1972——*Plectranthus bulleyanus* Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**:229. 1912; **7**:247, 314. 1912; 384. 1913; Dunn in ibid. **6**:139. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:941. 1936; et in Act. Hort. Göthob. **13**:365, in clavi, 374. 1939——*Isodon bulleyanus* (Diels) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:124. 1929.

20 a. 苍山香茶菜(原变种)

var. **bulleyana**

矮小灌木, 高 0.6—0.9 米。最外面的小枝近草质, 四棱形, 紫色。叶狭卵圆形, 楔状渐狭至叶柄, 草质, 具腺点, 上面有短的小硬毛, 边缘具牙齿, 连叶柄长 4—6 厘米, 宽 2—2.5 厘米。总状花序由极短的聚伞花序所组成, 狭窄, 长 6—8 厘米, 聚伞花序自其后退化的苞片腋内生出。花萼被小疏柔毛, 长 2.5 毫米, 萼齿近等大, 卵圆状三角形。花冠深蓝色, 基部玫瑰红色, 被小疏柔毛, 冠筒长 5—7 毫米, 基部浅囊状, 冠檐二唇形, 上唇 4 裂, 长约 4 毫米, 下唇长 5—6 毫米。(标本未见, 摘自原描写)

产云南西部; 生于干燥地灌丛中, 海拔 2700—3000 米。模式标本采自云南大理(苍山东坡)。

20b. 多叶变种

var. **foliosa** C. Y. Wu, 云南植物志 **1**:766. 1976.

这一变种与原变种不同在于聚伞花序生于向上渐变小的苞叶腋内, 苞叶与叶同形, 边缘齿变少或近全缘, 叶状, 仅最上部呈苞片状。

产云南西部; 生于杂木林下。模式标本采自云南邓川。

系 2. 皱叶香茶菜系——Ser. Rugosae Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:353. 1897 sub genus *Plectranthus* L' Herit., ut "Rugosi".

花萼具近相等的 5 齿; 花冠中等大, 冠筒下曲; 聚伞花序组成多少疏散圆锥花序: