

22. 山地香茶菜 朴荀儿(四川甘孜) 图版 98:13—15

Rabdosia oresbia (W. W. Smith) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7):198. 1972——*Plectranthus oresbius* W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinburgh **9**:118. 1916; Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. **48**:216. 1929; Hand. -Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:363. 1939, in clavi——*Isodon oresbius* (W. W. Smith) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:120. 1929.

小灌木,高至 60 厘米,具极多分枝。老枝近无毛,无叶,常脱皮,幼枝钝四棱形,密被灰白色星状及单生短绒毛。叶对生,卵形,长 0.7—1.5 厘米,宽 0.5—1.3 厘米,先端钝,基部圆形或微心形,边缘具规则的圆齿,上面榄绿色,被星状短柔毛及单毛,下面灰白色,密被星状短绒毛及单生绒毛,坚纸质,两面均具皱纹,侧脉 3—4 对,斜上升,与中肋在上面凹陷下面隆起;叶柄长约 3 毫米,腹凹背凸,密被星状短绒毛及单生绒毛。聚伞花序腋生,被与茎相同的毛被,具 3—5 花,具梗,总梗长约 5 毫米,花梗长约 2 毫米;苞叶与叶同形,向上渐变小且变全缘,小苞片线形,长达 2 毫米。花萼钟形,长约 4 毫米,直径约 3.5—4 毫米,外面尤其是在萼筒上被白色星状短柔毛及单毛,内面无毛,萼齿 5,长三角形,近相等,长约 2 毫米,基部宽约 1 毫米。花冠淡紫或紫蓝色,外面被星状小疏柔毛,内面无毛,冠筒微超过花萼,基部上方浅囊状,至喉部宽约 1.5 毫米,冠檐二唇形,上唇外反,与下唇约等长,长约 3.5 毫米,先端具相等四圆裂,下唇俯垂,阔卵圆形。雌雄蕊内藏。成熟小坚果未见。 花期 7—9 月。

产云南西北部,四川西部,西藏东南部;生于干燥山坡岩石上或灌丛中,海拔 2100—3400 米。模式标本采自云南丽江。

四川甘孜用全草入药,内服治内脏肿块出血。

23. 道孚香茶菜

Rabdosia dawoensis (Hand.-Mazz.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7):194. 1972——*Plectranthus dawoensis* Hand. -Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:371. 1939.

小灌木,高达 25 厘米,具分枝。下部老枝无叶,栓皮剥离,幼枝多叶,被灰色星状短绒毛。叶对生,卵形或卵状三角形,长 10—25 毫米,宽 6—17 毫米,先端锐尖或钝,基部楔形或略呈截状楔形,边缘除基部外均具圆齿,圆齿粗大,但具不明显的单腺体和外弯的边缘,坚纸质,上面被密而细微的糠秕状疏柔毛,脉纹凹陷,微皱,下面被密而细的星状短绒毛,侧脉每侧 3—4,与中脉在上面凹陷下面隆起;叶柄长 2—8 毫米,腹凹背凸,密被白色星状短绒毛。穗状圆锥花序长 2—7 厘米,被灰白或淡绿色的星状短绒毛,在枝梢密集,由 3—5 花的聚伞花序组成;苞叶向上渐变小,呈苞片状,无

