

29. 蕘花香茶菜 图版 97:1—3

Rabdosia wikstroemioides (Hand. Mazz.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 203 1972——*Plectranthus wikstroemioides* Hand. Mazz. in Act. Hort. Götthob. **13**: 364, in clavi, 369, descr. 1939.

小灌木,高 0.6—1.5 米,多分枝。老枝圆柱形,多少具稜角,灰褐色,变无毛,皮层不规则纵裂,髓部小而白色,幼枝钝四稜形,褐色,具浅槽及条纹,极密被具腺短绒毛,多叶。茎叶对生,椭圆形或披针形或倒披针形,长 0.8—1.5 厘米,宽 0.5—0.7 厘米,先端锐尖或下部茎叶先端近圆形,基部宽楔形至圆形或近截平而骤然渐狭,全缘或中部以上疏生少数不明显的牙齿,坚纸质,上面绿色,密被短绒毛及乳突状腺点,脉网密集而带黄色,下面灰白色,极密被由卷曲单毛组成的绒毛,脉网凸起,被淡黄腺点,侧脉每侧 3—5,斜伸,在叶齿之下网结;叶柄长 1—4 毫米,腹凹背凸,密被短绒毛及腺点。聚伞花序生于茎枝上部渐变小及渐狭的叶腋内,3—5 花,比叶短,具短梗,总梗与花梗近等长,长 1—3 毫米,均密被具腺短绒毛。花萼钟形,开花时长约 4 毫米,外密被具腺短绒毛,内面无毛,10 脉,萼齿 5,近等大,狭三角形,长约为花萼长 1/3,先端锐尖,果时花萼稍增大,管状钟形,长约 6 毫米,脉纹十分明显。花冠紫色或白色而具紫条纹,长约 7 毫米,外被白色短柔毛,内面无毛,冠筒直,长约 3 毫米,基部狭筒形,向上骤然增大,冠檐二唇形,上唇外反,长约 3.5 毫米,先端具相等的四圆裂,下唇阔卵圆形,长约 4 毫米,内凹,平伸。雌雄蕊内藏。成熟小坚果长圆状三棱形,长达 1.5 毫米,黑褐色,无毛。

产云南西北部,四川西部;生于山谷、坡地灌丛中,海拔(2350)2500—3200 米。模式标本采自云南德钦。

30. 波齿香茶菜

Rabdosia sinuolata C. Y. Wu et H. W. Li in Addenda 586.

灌木,多分枝。幼枝褐色,钝四稜形,具浅槽及细条纹,密被腺短柔毛;老枝灰褐色,近圆柱形,具条纹,变无毛,脱皮。茎叶卵形至宽卵形,长 0.5—2.7 厘米,宽 0.3—2 厘米,大小不等,先端钝或锐尖,基部截状圆形,极阔的楔形或阔楔形,边缘除基部外具波状圆齿,厚纸质,上面灰绿色,网脉凹陷,微皱,被极短柔毛,下面灰白色,网脉凸起,密被白色卷曲短柔毛或微柔毛,侧脉每侧约 3—4,斜上升,与中脉在上面凹陷下面十分隆起;叶柄长 0.2—1 厘米,腹平背凸,密被卷曲短柔毛。聚伞花序 3—7 花,生于茎枝上部叶腋内,密被腺短柔毛,具长 4—6 毫米的总梗,花梗长 1.5—3 毫米;苞叶与叶同形,向上渐变小,小苞片线形,微小,长约 1.5 毫米,被腺短柔毛。花萼管状钟

