

形,长约4毫米,宽约3毫米,外密被腺短柔毛,内面无毛,萼齿5,近相等,卵状披针形,先端长渐尖,长约为萼长之半。花冠浅紫色,长5—8毫米,外被小疏柔毛,内面无毛,冠筒长为花冠长之半,基部上方浅囊状,至喉部宽达2毫米,冠檐二唇形,上唇比下唇稍短,外反,先端具相等四圆裂,下唇平伸,内凹。雄蕊4,内藏或微伸出,花丝扁平,中部以下具髯毛。花柱伸出,先端具相等2浅裂。花盘环状。成熟小坚果未见。花期9月。

产西藏东部;生于山坡上,海拔3000—3300米。模式标本采自西藏察雅。

31. 细叶香茶菜 楷深格鲁(四川若尔盖) 图版 97: 11—12

Rabdosia tenuifolia (W. W. Smith) Hara in Journ. Jap. Bot. 47(7): 201. 1972—*Plectranthus tenuifolius* W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinburgh 9:118. 1916; Hand. Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13: 364. 1939, in clavi—*Isodon tenuifolius* (W. W. Smith) Kuod in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 119. 1929

小灌木,高达1厘米,极多分枝。老枝近圆柱形,具稜角,淡黄褐色,皮层纵向剥落,幼枝伸长,极柔弱,钝四棱形,极密被灰白色短绒毛。茎叶对生,披针形或卵圆状披针形,长0.8—2厘米,宽0.5—1厘米,先端锐尖或微锐尖,基部楔形至近圆形,边缘在中部以上疏生细圆状锯齿至全缘,坚纸质,上面绿色,密被小疏柔毛,中肋及侧脉黄白色,下面灰白色,极密被短绒毛,侧脉每侧3—4,斜上升,两面隆起;叶柄长3—5毫米,腹凹背凸,极密被灰白色小绒毛。总状圆锥花序顶生于枝上,长可达20厘米,由5—7花的聚伞花序组成,聚伞花序具梗,总梗长2—5毫米,与长1—2毫米的花梗均密被灰白小绒毛;下部苞叶叶状,长超过聚伞花序,上部者渐变小,呈苞片状,全缘,稍超过聚伞花序或与其等长,小苞片线状,微小,长约1毫米,密被灰白小绒毛。花萼钟形,长达3毫米,外密被灰白短绒毛,内面无毛,萼齿5,近等大,三角形,长约为花萼长1/3,先端锐尖。花冠白微紫、微红或淡紫色,长约7毫米,外被小疏柔毛,内面无毛,冠筒长约3毫米,直伸,基部上方骤然浅囊状,至喉部宽达1.5毫米,冠檐二唇形,上唇外反,长约2.5毫米,先端具相等四圆裂,下唇圆状卵圆形,长约4毫米,内凹,平伸。雄蕊4,内藏,花丝扁平,中部以下具髯毛。花柱丝状,内藏,先端相等2浅裂。花盘环状。成熟小坚果未见。花期9月。

产云南西北部及四川西南部;生于山坡灌丛或路边,海拔1900—3000米。模式标本采自云南德钦奔子栏。

32. 小叶香茶菜

Rabdosia parvifolia (Batalin) Hara in Journ. Jap. Bot. 47(7): 198. 1972—

