

Caryopteris parvifolia Batalin in Act. Hort. Petrop. **13**: 98. 1893——*Plectranthus discolor* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 155. 1913; in *ibid.* **6**: 140. 1915——*Plectranthus parvifolius* (Batalin) Pei, 科学社研究丛刊 **1**(3): 183. 1932; Hand. Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**: 93. 1934; Symb. Sin. **7**: 937. 1936; et in Act. Hort. Göthob. **13**: 364, in clavi, 373. 1939, non W. A. Talbot 1897——*Isodon discolor* (Dunn) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 119. 1929.

小灌木,高0.5—5米,多分枝,分枝细弱,老枝圆柱形,灰黄色,变无毛,皮剥落,幼枝四棱形,被白色贴生短绒毛,通常稜上最密,具条纹。叶对生,小,长圆状卵形、卵形或阔卵形,长0.4—1.5厘米,宽0.4—1.4厘米,先端圆形,基部截状短渐狭,边缘全缘或具大而粗的圆齿,纸质,上面榄绿色,被极短腺微柔毛,网脉较明显,下面灰白色,密被贴生短绒毛,仅中肋及侧脉微隆起;叶柄长2—12毫米。聚伞花序腋生,1—7花,长0.8—2.3厘米,具梗,总梗长2—12毫米。花萼钟形,长约3毫米,口部直径约3毫米,外面密被白色短绒毛,略呈3/2式二唇形,萼齿5,卵三角形,其长稍短于萼筒,近等大,下唇2齿稍长,果时花萼增大,外折。花冠浅紫色,长约9毫米,外面被疏柔毛,内面无毛,冠筒长约4毫米,基部上方浅囊状,直径约3毫米,冠檐二唇形,上唇上反,先端具四圆裂,下唇伸展,近圆形,内凹。雄蕊及花柱微伸出。小坚果小,褐色,光滑。花期6—10月,果期7—11月。

产四川西部,甘肃南部,陕西西南部及西藏;生于干旱灌丛中,海拔1650—2800米。等模式标本采自四川西部岷江河谷、康定至成都间。

33. 细毛香茶菜

Rabdosia hirtella (Hand.-Mazz.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 196. 1972——*Plectranthus hirtellus* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 370. 1939.

灌木或半灌木,高1—1.5米。茎直立,多分枝,老枝黄褐色,近圆柱形,具细条纹,无毛,幼枝钝四棱形或近圆柱形,极密被短而平展的微硬毛。茎叶对生,卵圆形或阔卵圆形,长1—3厘米,宽0.7—2.5厘米,先端锐尖或钝,基部截形或阔楔形,骤然渐狭至叶柄,边缘在基部以上具细圆齿状锯齿,纸质,上面榄绿色,极密被微硬毛,下面淡绿色,极密被灰白短绒毛或被微硬毛及腺点,有时变无毛,叶柄长达1厘米,腹平背凸,极密被灰白微硬毛。狭圆锥花序顶生或腋生,长7—15厘米,由下部远离上部连续的聚伞花序组成,聚伞花序3—5花,无梗或具短梗,序轴密被灰白微硬毛;苞叶近圆形,径0.4—1.5厘米,先端钝或圆形,基部心形,无柄或近无柄,向上渐变小呈苞片状,小苞片线形,微小,长约1毫米,被微硬毛。花萼钟形,长约3毫米,外密被微硬

毛,内面无毛,萼齿5,三角形,锐尖,长约为萼筒长 $1/2$,近相等或微呈 $3/2$ 式二唇形,果时花萼管状钟形,长约4毫米,脉纹显著。花冠白色微紫或蓝紫色,长达5毫米,外密被疏柔毛,内面无毛,冠筒长约2.5毫米,内藏,基部上方浅囊状,至喉部直径约1.5毫米,冠檐二唇形,上唇长约1.5毫米,外反,先端具四圆裂,下唇长约2.5毫米,内凹。雄蕊4,内藏。花柱丝状,先端相等2浅裂,稍伸出。成熟小坚果未见。

产云南东北部及四川西南部;生于山坡阳处,海拔850—1300米。模式标本采自云南巧家。

34. 碎米桠(四川南川) 破血丹(四川巴县),野蔷薇花(湖北房县),山香草(贵州凤岗),雪花草(贵州瓮安),野蔷薇(贵州贵阳),冬凌草、冰凌草、六月令、山荏(河南)。

Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 199. 1972 — *Plectranthus rubescens* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 273. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**: 141. 1915; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 368, in clavi, 376. 1939 — *Plectranthus ricinispermus* Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. s. **17**: 707. 1910; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 142. 1915, p. p.; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 368, in clavi 1939 — *Plectranthus dichromophyllus* Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**: 562. 1900; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 365, in clavi. 1939 — *Isodon henryi* (Hemsl.) Kudo var. *dichromophyllus* (Diels) Kudo in Mam. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 123. 1929 — *Isodon ricinispermus* (Pamp.) Kudo in l. c. 132. 1929 — *Rabdosia ricinisperma* (Pamp) Hara in l. c. 199. 1972 — *Rabdosia dichromophylla* (Diels) Hara in l. c. 194. 1972 — *Plectranthus inflexus* auct. non (Thunb.) Vahl: Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**: 376. 1934, p. p.; in ibid. **13**: 376. 1939.

小灌木,高(0.3)0.5—1(1.2)米;根茎木质,有长纤维状须根。茎直立,多数,基部近圆柱形,灰褐色或褐色,无毛,皮层纵向剥落,上部多分枝,分枝具花序,茎上部及分枝均四棱形,具条纹,褐色或带紫红色,密被小疏柔毛,幼枝极密被绒毛,带紫红色。茎叶对生,卵圆形或菱状卵圆形,长2—6厘米,宽1.3—3厘米,先端锐尖或渐尖,后一情况顶端一齿较长,基部宽楔形,骤然渐狭下延成假翅,边缘具粗圆齿状锯齿,齿尖具胼胝体,膜质至坚纸质,上面榄绿色,疏被小疏柔毛及腺点,有时近无毛,下面淡绿色,密被灰白色短绒毛至近无毛,侧脉3—4对,两面十分明显,脉纹常带紫红色;叶柄连具翅假柄在内长1—3.5厘米,向茎、枝顶部渐变短。聚伞花序3—5花,最下部者有时多至7花,具长2—5毫米的总梗,在茎及分枝顶上排列成长6—15厘米狭圆锥