

产云南中南部;生于山坡阳处路旁,海拔 1000—1300 米。模式标本采自云南石屏。

系 3. 多叶香茶菜系——Ser. *Pleiophyllae* C. Y. Wu et H. W. Li in *Addenda* 586.

花萼钟形,具近相等的齿或微呈 $3/2$ 式二唇形;花冠中等大,冠筒下曲;聚伞花序腋生,或有时由于苞叶变小而排列成圆锥花序;灌木或小灌木,小枝、叶及花萼的毛被不密集,叶均无皱。

38. 柔茎香茶菜 图版 96

Rabdosia flexicaulis C. Y. Wu et H. W. Li in *Addenda* 586.

灌木,高达 1 米。茎柔韧上升,近圆柱形,具细条纹,淡黄褐色,密被腺体及微柔毛,其间疏布具节小疏柔毛,髓部大,白色,多分枝,分枝纤细,伸长,曲折。茎叶对生,三角状卵圆形,在分枝上者较小,长 2—4 厘米,宽 1.3—2.8 厘米,先端锐尖,基部宽楔形至近截形,边缘具整齐的牙齿,近膜质,上面榄绿色,疏被小柔毛及浅黄色腺点,下面淡绿色,沿脉上被小柔毛,余部散布腺点,侧脉约 4 对,与中脉在上面微隆起下面明显凸出;叶柄纤细,长 1.5—3 厘米,腹平背凸,密被具节小疏柔毛及微柔毛。聚伞花序 3—5 花,具长 0.5—1.5 厘米的总梗,生于茎及分枝上部苞叶腋内,组成长约 10 厘米的圆锥花序,由于分枝多而密集,因而植株全体形成庞大的圆锥花序,序轴密被腺体,其间疏布具节小疏柔毛,总梗及花梗密被微柔毛及腺体;在花序下部的苞叶与茎叶同形,向上变小,呈苞片状,具圆齿或近全缘,具柄或近无柄,先端锐尖,基部宽楔形。花萼花时钟形,长约 3 毫米,外被微柔毛及腺点,内面无毛,萼齿 5,均卵圆状长三角形,长约 1.5 毫米,先端锐尖,边缘具小缘毛,略呈 $3/2$ 式二唇形,上唇 3 齿,中齿稍小,下唇 2 齿,稍长,果时花萼增大,管状钟形,长达 7 毫米,略向上弯,脉纹凸起。花冠白色,微红,长达 1.1 厘米,外疏被微柔毛及腺点,内面无毛,冠筒长约 5 毫米,基部上方浅囊状,径达 2 毫米,至喉部略收缩,径约 1.5 毫米,冠檐二唇形,上唇直立,外反,宽大,长 4 毫米,宽达 6 毫米,先端具四圆裂,下唇宽卵圆形,长 6 毫米,宽 4.5 毫米,基部收缩,内凹,舟形。雄蕊 4,内藏,花丝扁平,中部以下具髯毛。花柱丝状,先端相等 2 浅裂。花盘环状,具齿。成熟小坚果长圆状三棱形,长约 2 毫米,淡黄色,有黄白色斑纹。花、果期 9 月。

产四川西南部;生于河谷路旁或灌丛下,海拔 2100—2450 米。模式标本采自四川木里。

