

缘,小苞片十分微小,钻形。花萼花时钟形,长约4毫米,外被腺微柔毛,10脉,内面无毛,萼齿5,略呈二唇形,上唇3齿,中齿稍小,均三角形,长约1.5毫米,先端具突尖,下唇2齿,稍大,三角形,先端具突尖,果时花萼增大,呈管状钟形,长达6毫米,脉纹凸起。花冠粉红色,长约8毫米,外面沿下唇疏被微柔毛,内面无毛,冠筒长3.5毫米,基部上方浅囊状,至喉部宽约2毫米,冠檐二唇形,上唇长约3毫米,外反,先端具四圆裂,下唇宽卵圆形,长约4毫米,内凹。雄蕊4,内藏。花柱丝状,先端相等2浅裂,稍露出。花盘环状,近全缘。成熟小坚果长圆状三棱形,长约2毫米,褐色,无毛。花、果期9—10月。

产四川西南部;生于向阳草坡上,海拔2150米。模式标本采自四川木里。

44. 多叶香茶菜

Rabdosia pleiophylla (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **13**(1): 87 1975——*Plectranthus pleiophyllus* Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**: 228. 1912; **7**: 120. 314. 1912; 384. 1913; Dunn in ibid. **6**: 143. 1915; Hand. -Mazz. in Act. Hort. Gothob. **13**: 366. 1939, in clavi——*Isodon pleiophyllus* (Diels) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 121. 1929.

44a. 多叶香茶菜

var. *pleiophylla*

灌木,高1—1.5米。茎直立,多分枝,老枝灰褐色,钝四棱形,具条纹,毛被脱落,具纵向剥落的皮层,髓部白色,小,幼枝多少四棱形,具四浅槽,浅褐色,密被腺微柔毛。茎叶对生,常长于节间,卵圆形或近圆形,长1.5—4.5厘米,宽1.5—3厘米,先端锐尖、钝至近圆形而具尖头,基部宽楔形至圆形,边缘除基部外有整齐的锯齿,上面深绿色,散布细小具腺微柔毛及夹有浅黄色腺点,下面淡绿色,疏布同一式毛及腺点,侧脉4—5对,与中肋在上面明显下面凸出,网脉两面明显可见;叶柄极短,长1—3毫米。聚伞花序3—5—7(11)花,具长梗,最下部总梗长2—3(4)厘米,渐次向上变短,自枝条中部以上叶腋内生出,由于上部苞叶变小呈苞片状,因而整体形成长约10厘米的圆锥花序,花梗长2—3毫米,与总梗及序轴密被腺微柔毛;苞片近圆形,全缘或具疏锯齿,先端突尖,小苞片微小,线形,长约1毫米。花萼花时宽钟形,长约4毫米,口部宽达4毫米,带紫色,外密被腺微柔毛,内面无毛,萼齿5,3/2式二唇形,裂不及1/2,齿均卵状三角形,先端锐尖,前2齿较大,果时花萼长达6毫米,管状钟形,弯曲,脉纹十分明显。花冠浅蓝、蓝紫或深蓝色,外面仅冠檐略被微柔毛,内面无毛,冠筒长约4毫米,基部上方浅囊状,至喉部等宽,径约2.5毫米,冠檐二唇形,上唇长约2.5毫