

齿。小坚果卵球形,长约1毫米,棕褐色,无毛。 花期9—10月,果期10—11月。
产云南中部;生于山坡灌丛中,海拔约2200米。模式标本采自云南昆明黑龙潭。

系5. 四川香茶菜系——Ser. *Setschwanenses* C. Y. Wu et H. W. Li in *Addends* 588.

花萼钟形,具近相等的长齿,裂至花萼长1/2或以下;花冠中等大,冠筒下曲;聚伞花序组成狭圆锥花序;多年生草本,半灌木或灌木。

49. 狭叶香茶菜

Rabdosia angustifolia (Dunn) Hara in *Journ. Jap. Bot.* **47** (7): 194. 1972
——*Plectranthus angustifolius* Dunn in *Notes Bot. Gard. Edinburgh* **8**: 154. 1913,
p. p. excl. Wilson n. 2577; et in *ibid.* **6**: 139. 1915, p. p. excl. Wilson n. 2577;
Hand.-Mazz. in *Act. Hort. Göthob.* **9**: 43. 1934; *Symb. Sin.* **7**: 944. 1936; et in
Act. Hort. Göthob. **13**: 367. 1940, in clavi——*Isodon angustifolius* (Dunn) Kudo in
Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 137. 1929.

49a. 狭叶香茶菜 图版 98:3—4

var. ***angustifolia***

多年生草本;根粗厚,木质。茎丛生,高85—116厘米,钝四棱形,具浅槽或无槽,被短柔毛。茎叶对生,线状长圆形,披针形,倒披针形,有时长圆状倒披针形,长2.2—9.5厘米,宽1—2.4厘米,先端锐尖或钝,基部狭楔形,边缘自基部以上具锯齿或极浅的锯齿,有时近全缘,纸质,上面榄绿色,被极短柔毛及黄色小腺点,中脉上较密,或近无毛,下面较淡,网脉十分隆起,脉上被贴生短柔毛,中脉上较密,余部密布黄色小腺点;叶柄短,长1—3毫米。花序为由聚伞花序组成的顶生圆锥花序,长6—34厘米,宽(1.5)3.5—11厘米,被腺短柔毛,聚伞花序具3—23花,具梗,总梗长0.5—4.8厘米,花梗长2—8毫米;下部的苞片叶状,卵状披针形至披针形,上部的小,线状披针形至线形,小苞片小,针状。花萼花时钟形,长约4毫米,口部直径约3.5毫米,外面被污黄色短硬毛及黄色小腺点,萼齿5,披针状三角形,长约2毫米,果时花萼管状钟形,长约7毫米,萼齿微呈3/2式二唇形。花冠蓝色,长约11毫米,冠筒长为花萼长之2倍,基部具浅囊状突起,直径约2毫米,冠檐二唇形,上唇长约4.5毫米,先端具四圆裂,下唇与上唇近等长,近圆形,舟形,内凹。雄蕊内藏,在雌蕊花柱较短的花中,其长度超过花柱,在雌蕊花柱较长的花中,则短于花柱。花盘厚环状。小坚果紫褐色,近圆形,略扁,直径约1.8毫米。 花期9—10月,果期10—11月。

产云南中部、中南部及西北部;生于草坡或松林下,海拔1200—2600米。等模式