

花萼宽钟形,长达5毫米,近无毛。花冠淡紫色,长5—6毫米,外被较密小疏柔毛及稀疏腺点,冠筒长约3毫米,基部后方浅囊状,略超出花萼,与冠檐近相等或稍短,冠檐二唇形,上唇外反,先端具四圆裂,下唇宽卵形或圆形,稍长于上唇,内凹。雄蕊4,二强,下倾,上对着生于冠筒基部,下对着生于冠筒喉部,内藏或略伸出。花柱丝状,先端相等2裂。小坚果卵球形,长1.5毫米,黄褐色,无毛。花期7—9月,果期9—10月。

产四川西部;生于路旁及阳坡灌丛中,海拔2500—3200米。模式标本采自四川西部。

54. 雪花香茶菜 图版 91

Rabdosia chionantha C. Y. Wu in Addenda 588.

灌木,高约1米。茎枝柔弱,常曲折,老枝近圆柱形,黄褐色,无毛,皮层剥落,幼枝钝四棱形,密被灰白色短疏柔毛。茎叶对生,宽卵圆形或圆状卵圆形,在枝条下部的1—2对变小,长1.5—2.5厘米,宽0.5—1.5厘米,在枝条上部者最大,长达4.5厘米,宽达3.3厘米,先端锐尖,基部宽楔形,骤狭下延至叶柄,边缘在基部以上具圆齿,草质,上面榄绿色,沿脉上密被短疏柔毛,余部散布小硬毛,下面淡绿色,被微柔毛,侧脉3—4对,斜向上弯曲,在叶齿下网结,与中脉两面微隆起;叶柄长0.5—2.5厘米,腹平背凸,上部微具翅,密被灰白短疏柔毛。狭圆锥花序长4—15厘米,顶生于分枝上,直立或常弯垂,由5—7花的聚伞花序组成,聚伞花序具梗,总梗长3—10毫米,花梗丝状,长2—5毫米,总梗、花梗与序轴均密被灰白短疏柔毛;花序下部一对苞叶叶状,圆状卵圆形,长达2厘米,具短柄,先端尾状渐尖,其余苞叶苞片状,卵圆状披针形,均短于聚伞花序很多,长约1厘米,具短柄,先端尾状渐尖,小苞片线形,微小,长约1毫米。花萼宽钟形,长4.5毫米,外密被短疏柔毛,内面无毛,10脉,萼齿5,微呈 $3/2$ 式二唇形,上唇3齿,齿长三角形,长约2毫米,先端锐尖,下唇2齿,齿披针状三角形,长2.5毫米,果时花萼增大,长5毫米,下部管状,上部宽钟形,略弯曲,萼齿多少呈二唇形,狭长而极叉开。花冠白色,或下唇带紫点,长达9毫米,外被短疏柔毛,内面无毛,冠筒长约4毫米,基部上方骤然囊状,至喉部宽达2.5毫米,冠檐二唇形,上唇外反,长约2.5毫米,先端具四圆裂,下唇卵圆状圆形,长达5毫米,内凹,舟形。雄蕊4,微伸出,花丝丝状,中部以下略具髯毛。花柱丝状,伸出,先端相等2浅裂。花盘环状,近全缘。成熟小坚果长圆形,长约1毫米,棕褐色,无毛。花、果期6—7月。

产四川西部;生于山坡灌丛中、林缘或溪边,海拔2400—2700—3300米。模式标本采自四川木里。

