

Symb. Sin. **7**: 942. 1936; in Beih. Bot. Centralbl. **56B** (3): 459. 1937; et in Act Hort. Göthob. **13**: 379. 1939——*Plectranthus striatus* auct. non Benth.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 139. 1915, p. p. quoad syn. *Plectranthus gerardianus* Benth et *P. tatei* Hemsl. et specim. Tatci.

这一变种与原变种不同在于植株高大,高 30—150 厘米;叶大,卵形,长达 20 厘米,宽达 8.5 厘米,先端渐尖,基部楔形。

产西藏,云南,四川,甘肃,贵州,广西,广东,湖南;生于杂木林下及灌丛中,海拔 430—2900 米。印度,锡金,尼泊尔,缅甸,泰国,老挝,越南也有。模式标本采自印度北部。

根或全草入药,治急性黄疸型肝炎、急性胆囊炎,并可驱蛔虫。

56c. 细花变种

var. **graciliflora** (Benth.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 197. 1972——*Plectranthus graciliflorus* Benth. in DC. Prodr. **12**: 56. 1848——*Plectranthus gerardianus* Benth. var. *graciliflorus* (Benth.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 618. 1885, excl. syn.——*Plectranthus stritus* Benth. var. *graciliflorus* (Benth.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob **13**: 379. 1939——*Plectranthus striatus* auct. non Benth.: Doan in Lecte. Fl. Gén Indo-Chine **4**: 948. 1936, p. p. quoad syn.

这一变种与原变种不同在于茎高 40—100 厘米;叶卵状披针形至披针形,长 5—8.5 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端渐尖,基部楔形,上面微粗糙至近无毛,下面脉上微粗糙,其余部分满布褐色腺点,干后常带红褐色。

产广东,福建,江西;生于田间或山谷水边。锡金,尼泊尔,印度,缅甸,越南也有。模式标本采自印度北部。

本变种与长叶香茶菜 *Rabdosia stracheyi* (Benth.) Hara 十分相近,但后者以叶狭披针形,茎被栗色串珠状多节短柔毛或鳞秕状短毛而可以与前者区分开。

56d. 小花变种

var. **micrantha** C. Y. Wu, 云南植物志 **1**:774. 1976.

这一变种与原变种不同在于花较小,长 2—3 毫米;叶被极疏具节微硬毛,下面常带紫色。

产云南南部,贵州南部;生于林下、沟边润湿处,海拔 1000—2000 米。模式标本采自云南砚山。

57. 刚毛香茶菜 烂脚丫巴草(云南保山) 图版 103:9

Rabdosia hispida (Benth.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 196. 1972——*Plectranthus hispidus* Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **2**: 17. 1831; Labiat. Gen. et Sp. 41. 1832; et in DC. Prodr. **12**: 57. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 618. 1885——*Plectranthus chienii* Sun ex C. H. Hu in Act. Phytotax. Sin **11**(1): 52. 1966——*Isodon hispidus* (Benth.) Murata in Act. Phytotax. Geobot. **24**: 82. 1969.

多年生草本；根茎木质，块茎状，向下密生纤维状须根。茎上升，有时基部匍匐生根，高 33—100 厘米，四棱形，具深槽，密被棕色具节长柔毛，不分枝或 2/3 处塔状分枝。茎叶对生，卵形至椭圆形，长 3—11.5 厘米，宽 1.5—5.5 厘米，先端锐尖至渐尖，基部楔形或圆形渐狭成短的具翅假柄，上部叶的基部通常圆形，边缘除基部近全缘外具锯齿，上部叶有时基部亦具锯齿，草质，上面榄绿色，被具节糙硬毛，下面较淡，脉上密被平展具节长柔毛，其余部分满布黑棕色腺点；无叶柄或近无柄。圆锥花序顶生或腋生，长 4.5—11 厘米，宽 2.5—4 厘米，被毛同于茎，但常较短，由聚伞花序组成；苞叶卵形，长 7—14 毫米，苞片小，卵形，远短于长 3—6 毫米纤细的花柄。花萼小，钟形，长与直径均约 2 毫米，密被糙硬毛，萼齿 5，阔卵状三角形，与萼筒近等长，二唇形，后 3 齿较短，其中齿尤其较小，前 2 齿较大，果时花萼增大，长约 3 毫米，直径 1.5—1.8 毫米，疏被具节短硬毛，无腺点或明显具红褐色腺点，多少俯垂。花冠白色，长 5.5—5.8 毫米，外面疏被微柔毛，冠筒直，长约 3.2 毫米，基部直径约 0.6 毫米，上部增宽，至喉部直径约 1.5 毫米，冠檐二唇形，上唇长约 1.5 毫米，具 4 深圆裂，裂片长圆形，极外反，下唇卵形，长约 3.2 毫米，伸展，扁平。雄蕊及花柱长长地伸出。小坚果极小，圆卵形，扁，具微观的小点。花、果期 10 月。

产云南西部、西北部；生于林下或灌丛中，海拔 2000 米。印度东北部，不丹，缅甸也有。模式标本采自印度东北部。

云南保山用其根茎另配狼毒、小茜草及马桑作跌打药。

58. 长叶香茶菜 四方草(广西) 图版 103: 11

Rabdosia stracheyi (Benth. ex Hook. f.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 201 1972——*Plectranthus stracheyi* Benth. ex. Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 618. Aug. 1885; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 158. 1913; in ibid. 6: 136, 139. 1915; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 162. 1927; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 366, in clavi, 378. 1939, excl. syn. *Plectranthus tatei* Hemsl.——*Plectranthus veronicifolius* Hance in Journ. Bot. Brit. & For. **23**: 327. Nov. 1885; Baker in ibid. **24**: 119. 1886——*Plectranthus brandisii* Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal. **59**: 296. 1890——*Isodon*

