

云南龙陵用全草入药,治头痛。

67. 多花香茶菜 图版 106: 1—2

Rabdosia pluriflora C. Y. Wu et H. W. Li, 云南植物志, 1: 794, 图版 188, 1—2. 1976

草本,高 30—60 厘米。茎锐四棱形,具浅槽及条纹,带紫色,近无毛,具白色髓部。茎叶对生,卵状椭圆形,长 4.5—10.5 厘米,宽 1.8—4.2 厘米,先端尾状渐尖,基部阔楔形,边缘在基部以上具锯齿,齿尖具胼胝体,坚纸质,上面榄绿色,下面淡绿色,两面无毛,侧脉 5—6 对,与中脉均两面隆起;叶柄长 4—8 毫米,腹凹背凸,无毛。花序为由密集的狭圆锥花序组成的顶生及侧生复合圆锥花序,长 6—12 厘米,宽 3—5 厘米,聚伞花序通常 3 花,彼此密集,具梗,总梗与花梗近等长,长约 2 毫米,与序轴一样明显具稜角且稍被微柔毛;苞叶卵圆状披针形至披针形,向上渐变小,在花序最下部分枝处者长达 3 厘米,宽达 1.5 厘米,先端长渐尖,具短柄,边缘有浅锯齿,苞片及小苞片钻形至线形,微小,长约 1.5 毫米。果萼青褐色,圆球形至短管形,长 3—4 毫米,基部略呈球形,喉部略收缩,10 脉明显,其间在萼筒上部及萼齿处有凸起平行横脉连接,萼檐呈二唇形,上唇向上反折,3 齿,齿短三角形,下唇平伸,2 齿,齿长三角形,较大,长约 1 毫米。花未见。成熟小坚果倒卵状三棱形,长约 1.5 毫米,淡褐色,无毛。果期 10 月。

产云南西北部。生于杂木林中,水沟旁,海拔约 2700 米。模式标本采自云南丽江。

68. 多穗香茶菜(植物分类学报 11 卷 1 期)

Rabdosia polystachys (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 13(1): 92. 1975——*Plectranthus polystachys* Sun ex C. H. Hu in Act. Phytotax. Sin. 11(1): 54, pl. VII, f. 36—39. 1966.

68a. 多穗香茶菜(原变种) 图版 106: 3—5

var. **polystachys**

高大草本或灌木,高 1—2 米。茎四棱形,具浅槽及条纹,稜上常具狭翅,绿色或紫红色,近无毛。茎叶对生,卵状椭圆形,狭椭圆形至披针形,稀倒卵状披针形或倒披针形,长 5.2—21 厘米,宽 2—5.6 厘米,先端尾状渐尖、渐尖至钝,基部阔楔形至狭楔形,边缘锯齿状或为浅圆齿状锯齿,有时上部的叶近全缘,坚纸质,上面榄绿色,下面

图版 99: 川藏香茶菜(原变种) **Rabdosia pseudo-irrorata** C. Y. Wu var. **Pseudo-irrorata** 1. 花枝; 2. 花,侧面观; 3. 花萼纵剖,内面观; 4. 花冠纵剖,内面观; 5. 雌蕊; 6. 小坚果,腹面观。(曾孝濂绘)