

89. 龙胜香茶菜 图版 112: 8—13

Rabdosia lungshengensis C. Y. Wu et H. W. Li in Addenda 591.

多年生草本;根茎木质,向下生出纤细的须根。茎上升直立,高 20—50 厘米,下部常伏地,向地部分生出不定根,皮层剥落,麦秆色,钝四棱形,具极浅四槽,极密被短柔毛。茎叶对生,在茎中部者常靠近,狭披针形或椭圆形,长 5.5—7.5 厘米,宽 1.5—2 厘米,先端长渐尖,基部狭楔形,边缘在中部以上具粗锯齿,坚纸质,上面榄绿色,沿中肋及侧脉上极密被短柔毛,余部散布小硬毛,下面淡绿色,仅沿脉网上疏被小硬毛,余部被浅黄色微小腺点;叶柄长 0.5—0.8 厘米,腹平背凸,密被短柔毛。圆锥花序顶生及腋生,顶生者宽大,长约 10 厘米,宽约 5 厘米,腋生者生于茎中部以上叶腋内,狭小,长 2.5—10 厘米,宽 2—2.5 厘米,由 1—3 花轮伞花序组成,总梗长 1—1.5 毫米,花梗长 1.5—3 毫米,总梗、花梗及序轴均密被微柔毛;苞叶狭披针形至线状披针形,长 1—2 厘米,宽 3—4 毫米,具浅锯齿至近全缘,苞片线状披针形,长 2—5 毫米,小苞片微小,线形,长约 1 毫米。花萼紫绿色,花时钟形,长约 2 毫米,外被微柔毛及腺点,内面无毛,10 脉,3/2 式二唇形,上唇 3 齿,短三角形,锐尖,下唇 2 齿,三角形,锐尖,果时花萼增大,基部圆球形,全萼呈壶状钟形,长约 4 毫米,脉纹明显。花冠淡紫色,长约 7 毫米,外疏被微柔毛,内面无毛,冠筒长约 3.5 毫米,基部上方浅囊状,冠檐二唇形,上唇长约 2 毫米,外反,先端具 4 圆裂,下唇近圆形,长约 3.5 毫米,内凹。雄蕊 4,内藏。花柱丝状,先端相等 2 浅裂。花盘环状。成熟小坚果卵球形,长约 1.3 毫米,淡黄褐色,无毛。花、果期 11 月。

产广西北部;生于疏林下水旁阴处,海拔 480—700 米。模式标本采自广西龙胜。

90. 腺花香茶菜 路边金(云南下关),大钮子七(云南丽江),铁石元、食疙瘩(贵州威宁),水龙胆草(贵州兴义) 图版 105: 10—11

Rabdosia adenantha (Diels) Hara in Journ. Jap. Bot. 47(7): 193. 1972——*Plectranthus adenanthus* Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh 5:228. 1912; Dunn in ibid. 6:142. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:940. 1936; et in Act. Hort. Götthob. 13:368. in clavi, 374. 1939——*Isodon adenanthus* (Diels) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr.

图版 112: 1—7. 囊花香茶菜 *Rabdosia gibbosa* C. Y. Wu et H. W. Li, 1. 植株下部,示根茎及须根; 2. 植株上部,示侧生花枝; 3. 花,侧面观; 4. 花萼纵剖,内面观; 5. 花冠纵剖,内面观,兼示雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 小坚果,背面观。8—13. 龙胜香茶菜 *Rabdosia lungshengensis* C. Y. Wu et H. W. Li, 8. 植株上部,示花序; 9. 花萼纵剖,内面观; 10. 花冠纵剖,内面观,兼示雄蕊; 11. 雌蕊; 12. 果萼; 13. 小坚果,背面观。(曾孝濂绘)

