

5: Bot. 382. 1910——*Coleus formosanus* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 320. 1906; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 145. 1929.

这一变种与原变种不同在于花萼上唇中裂片比下唇短。

产台湾, 广东, 广西, 福建; 生于溪旁、路旁、旷野、山谷、山地及田野的草丛或林中。菲律宾也有。模式标本采自菲律宾吕宋。

族 4. 罗勒族——OCIMEAE Kudo

Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 106. 1929, p. p.——*Euocimeae* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1162, 1163. 1876, p. p.——*Tribus Ocimoideae* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 1. 1832; in DC. Prodr. 12: 30. 1848, p. p.——Subfam. *Ocimoideae* subtrib. *Moschosminae* Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a: 208, 364. 1897——*Tribus Ocimeae* subtrib. *Moschosminae* Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 106. 1929.

92. 龙船草属——*Nosema* Prain

Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal 72: 20. 1904.

草本。叶全缘或具细锯齿。轮伞花序多花密集, 彼此靠近排列成头状或穗状花序; 苞片通常比轮伞花序短; 花梗短。花萼卵圆形, 果时管状, 具 10 脉, 二唇形, 上唇宽大, 全缘, 有时两边各具极不明显的 1 个小齿, 长圆形, 下唇全缘, 近圆形, 长度为上唇 1/3—1/4。花冠筒短, 喉部扩大, 冠檐二唇形, 上唇宽大, 先端短 3 裂, 下唇全缘, 长圆形, 凹陷成舟状。雄蕊 4, 外伸, 花丝分离, 后对基部具齿状附属器, 花药 1 室。花柱先端 2 裂, 裂片不等大。花盘前方呈指状膨大, 其长度超过子房。小坚果长圆形或卵圆形, 光滑。

约 6 种, 主要分布于印度、泰国、老挝、越南至我国广东, 其中有 1 种间断出现于印度尼西亚(苏门答腊, 爪哇), 另 1 种产菲律宾。我国产下述 1 种。

1. 龙船草(海南营根) 狗尾射(赦)草(广东儋县、临高), 青缸草、红色草(广东澄迈), 全缘萼(中国植物科属检索表) 图版 115

图版 115: 龙船草 *Nosema cochinchinensis* (Lour.) Merr., 1. 植株; 2. 花, 侧面观; 3. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 小坚果, 背面观。(曾孝濂绘)