

属。

1. 尖头花(中国植物科属检索表) 鱼香草(贵州兴义) 图版 117

Acrocephalus indicus (Burm. f.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 511. 1891; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 109. 1929; Merr. et Metcalf in Lingnan Sci. Journ. **16**(2): 175. 1937; Mukerj. in Rec. Bot. Sur. Ind. **14**(1): 29. 1940; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1): 65. 1959; Back. & Bakh. f. Fl. Java **2**: 638. 1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**: 26, f. 2 a-g. 1969——*Prunella indica* Burm. f. Fl. Ind. 130. 1768——*Ocymum capitatum* Roth, Nova Pl. Spec. 276. 1821——*Acrocephalus capitatus* (Roth) Benth. in Bot. Reg. sub t. 1300 not. 97. 1829; in Wall. Pl. Asiat. Rar. **2**: 18. 1831; Labiat. Gen. et Sp. 23. 1832; et in DC. Prodr. **12**: 47. 1848; Hook. in Icon. Pl. **5**: t. 456. 1842; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 611. 1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 269. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 134. 1915; Ridley, Fl. Penins. Malay. **2**: 644. 1923; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 922, f. 96, 8—12. 1936.

一年生草本, 从纤细须根直立, 有时近于半灌木, 高达 0.5—1 米。茎四棱形, 基部有时倚伏地面, 近于木质, 从基部多分枝, 分枝纤细, 上升, 无毛或两侧疏被柔毛。叶披针形或卵圆形, 长 1.2—5 厘米, 宽 0.5—1.2 厘米, 先端钝, 基部渐狭下延至叶柄, 边缘疏生有锯齿, 草质, 上面绿色, 近于无毛, 下面淡绿色, 沿中肋及侧脉疏生短刚毛, 余部散布腺点, 侧脉 4—5 对, 与中肋在上面不显著下面微隆起; 叶柄长 0.2—0.7 厘米。轮伞花序多花, 多数覆瓦状排列组成球状或椭圆状的头状花序, 此花序具长梗或无梗, 其下常承以成对苞叶; 苞片多数, 承于轮伞花序之下, 通常菱状扇形, 先端锐尖, 无柄, 内凹, 长约 3 毫米, 外面在基部密被长柔毛, 内面无毛。花萼花时卵珠形, 长约 1.5 毫米, 外被疏柔毛, 内面无毛, 二唇形, 上唇全缘, 宽大而伸长, 下唇短, 具 4 齿, 齿钻形, 具缘毛, 果时花萼增大, 长达 3 毫米, 管状, 基部囊状增大, 喉部略收缩。花冠白至紫红色, 甚小, 长约 2 毫米, 稍伸出萼筒, 冠筒喉部钟形增大, 冠檐二唇形, 上唇短 4 裂, 下唇全缘。雄蕊 4, 内藏, 前对较长, 花丝分离, 丝状, 插生于花冠喉部, 花药卵圆形。花柱先端相等 2 浅裂。花盘前方呈指状膨大。小坚果卵珠形, 长约 1 毫米, 黑褐色, 光滑。花期 9—10 月, 果期 11 月。

产云南南部, 贵州东南部, 广东; 为一杂草, 生长于田间, 有时亦出现于林缘、竹丛及沟边, 海拔在 600 米以下。印度, 缅甸, 泰国, 老挝, 越南经马来西亚至印度尼西亚及菲律宾也有。模式标本采自印度。

