

或近无柄。轮伞花序具 4—6 花,在主茎及侧枝上组成疏松的总状花序;苞片小,近圆形,直径约 2 毫米,先端突尖,下面被短硬毛,上面无毛,边缘具小缘毛;花梗纤细,长 3—5 毫米,与序轴被短硬毛。花萼管状,花时长约 5.5 毫米,宽约 2 毫米,外面被小疏柔毛,内面无毛,上部呈紫红色,10 脉,二唇形,上唇大,圆形,直径约 2 毫米,先端具小突尖,边缘微下延,下唇具 4 齿,钻状,先端具 2—3 毫米的针尖,前 2 齿较长。花冠白色,比萼长一倍,外面被疏微柔毛,内面在冠筒略被微柔毛,冠筒超出花萼,长约 8 毫米,基部直径 1.8 毫米,喉部略宽,冠檐二唇形,上唇长宽约 4 毫米,先端具 4 圆裂,下唇长圆形,长 3.5 毫米,宽 3 毫米,内凹。雄蕊 4,短于花冠但伸出喉部,花丝分离,花药汇合成 1 室。花柱先端头状,浅裂。花盘前方膨大。小坚果近球形,直径 1.7 毫米,褐色,具极小的点。花期 8 月。

产广东海南;生于荒地上。模式标本采自广东海南崖县。

99. 肾茶属——*Clerodendranthus* Kudo

Kudo Prodr. in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:117. 1929.

多年生草本,有时半灌木状,具分枝。叶具柄,具齿。轮伞花序 6—10 花,在主茎或分枝上组成顶生的总状花序;苞片小,圆卵形,先端骤尖,全缘;花梗明显。花萼卵珠形,外被毛及腺点,内面无毛,二唇形,花后增大,10 脉,上唇大,圆形,边缘下延至萼筒,下唇具 4 齿,前 2 齿比侧 2 齿长。花冠浅紫或白色,外面被毛,内面无毛环,冠筒狭管状,近等大,长长地伸出花萼,直立,喉部不偏斜,冠檐大,上唇大,外反,先端 3 裂,中裂片较大,先端微缺,下唇直伸,狭,微凹。雄蕊 4,前对略长,下倾,伸出花冠甚长,约达花冠筒的 2 倍,花丝丝状,无齿,花药小,药室叉开。花柱长长地伸出,略超出雄蕊,先端棒状头形,2 浅裂。花盘前方呈指状膨大。子房 4 裂,无毛。小坚果卵形或长圆形,具皱纹。

约 5 种,产东南亚至澳大利亚,我国仅产下述 1 种。

1. 肾茶 猫须草(台湾、广东、云南),猫须公(广东),牙努秒(云南西双版纳傣语)

图版 123

Clerodendranthus spicatus (Thunb.) C. Y. Wu ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 12(2):215. 1974——*Clerodendron spicatum* Thunb. Fl. Jav. 22. 1825, non *Orthosi*

图版 123: 肾茶 *Clerodendranthus spicatus* (Thunb.) C. Y. Wu, 1. 植株; 2. 花, 侧面观; 3. 果萼, 侧面观; 4. 花萼纵剖, 内面观; 5. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 小坚果, 背面观。(曾孝濂绘)