

卵球状的毛丛；子房卵状，花柱长约8毫米，柱头2裂。果实卵形，长约5毫米，仅具少数种子。

产我国新疆。

6. 枸杞(神农本草经) 枸杞菜(广东、广西、江西)；红珠子刺(福建)；牛吉力(浙江)；狗牙子(四川)；狗牙根(陕西)；狗奶子(江苏、安徽、山东) 图版3：1—4

Lycium chinense Mill., Gard. Dict. ed. 8, no 5. 1768; 王云章, 北研丛刊2(4): 102. 1934. p. p.—*L. barbarum* β *chinense* Aiton, Hort. Kew. 1: 257. 1789—*L. trewianum* Roemer et Schultes, Syst. Veg. 4: 693. 1819—*L. sinense* Grenier et Godron, Fl. France 2: 542. 1850—*L. megistocarpum* Dunal var. *ovatum* Dunal, in DC. Prodr. 13(1): 510. 1852—*L. rhombifolium* Dip. in Dosch et Scriba, Excurs. Grossb. Hess. ed. 3: 218. 1888—*L. chinense* var. *ovatum* C. K. Schneid, Ill. Handb. Laubholzk. 2: 611, f. 395, f—g. 1907—12.

6a. 枸杞(原变种)

var. **chinense**

多分枝灌木，高0.5—1米，栽培时可达2米多；枝条细弱，弓状弯曲或俯垂，淡灰色，有纵条纹，棘刺长0.5—2厘米，生叶和花的棘刺较长，小枝顶端锐尖成棘刺状。叶纸质或栽培者质稍厚，单叶互生或2—4枚簇生，卵形、卵状菱形、长椭圆形、卵状披针形，顶端急尖，基部楔形，长1.5—5厘米，宽0.5—2.5厘米，栽培者较大，可长达10厘米以上，宽达4厘米；叶柄长0.4—1厘米。花在长枝上单生或双生于叶腋，在短枝上则同叶簇生；花梗长1—2厘米，向顶端渐增粗。花萼长3—4毫米，通常3中裂或4—5齿裂，裂片多少有缘毛；花冠漏斗状，长9—12毫米，淡紫色，筒部向上骤然扩大，稍短于或近等于檐部裂片，5深裂，裂片卵形，顶端圆钝，平展或稍向外反曲，边缘有缘毛，基部耳显著；雄蕊较花冠稍短，或因花冠裂片外展而伸出花冠，花丝在近基部处密生一圈绒毛并交织成椭圆状的毛丛，与毛丛等高处的花冠筒内壁亦密生一环绒毛；花柱稍伸出雄蕊，上端弓弯，柱头绿色。浆果红色，卵状，栽培者可成长矩圆状或长椭圆状，顶端尖或钝，长7—15毫米，栽培者长可达2.2厘米，直径5—8毫米。种子扁肾脏形，长2.5—3毫米，黄色。花果期6—11月。

分布于我国东北、河北、山西、陕西、甘肃南部以及西南、华中、华南和华东各省区；朝鲜，日本，欧洲有栽培或逸为野生。常生于山坡、荒地、丘陵地、盐碱地、路旁及村边宅旁。在我国除普遍野生外，各地也有作药用、蔬菜或绿化栽培。



图版 3: 1—4. 枸杞 *L. chinense* Mill., 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 花冠展开; 4. 一栽培类型的果。
5—6. 云南枸杞 *L. yunnanense* Kuang et A. M. Lu, 5. 花果枝; 6. 花冠展开。(王金凤绘)