

4. 龙葵(通称) 野辣虎(江苏苏州);野海椒(四川屏山、南川);小苦菜(四川会东);石海椒(四川南川);野伞子(四川城口);野海角(四川盐边);灯龙草(湖北巴东);山辣椒(河北内邱);野茄秧(云南蒙自);小果果(云南河口);白花菜(广东乐昌、惠阳);假灯龙草(海南儋县);地泡子(湖南);飞天龙(江西);天茄菜(贵州) 图版 19: 1—6

Solanum nigrum L. Sp. Pl. ed. 1: 186. 1753, ed. 2: 266. 1762; emend. Mill. Gard. Dict. ed. 8. 1. 1768; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 50. 1852; Maxim. in Prim. Fl. Amur. 475. 1859; Benth., Fl. Hongk. 242. 1861, p. p. maj.; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 229. 1883, p. p. maj.; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 171. 1890, p. p. maj.; Bonati in Lecte. Fl. Gén. L'Indo-Chine 4: 317. 1915, p. p. maj.; Ridl., Fl. Malay Penins. 2: 465. 1923; Sasaki, Cat. Governm. Herb. 451. 1930; Hand.-Mzt., Symb. Sin. 7: 827. 1936; Masamune, Short Fl. Form. 189. 1936, et Fl. Kainant. 295. 1943, sensu latissimo; Ohwi, Fl. Japon. 709. 1965.

4a. 龙葵(原变种)

var. *nigrum*

一年生直立草本,高0.25—1米,茎无棱或棱不明显,绿色或紫色,近无毛或被微柔毛。叶卵形,长2.5—10厘米,宽1.5—5.5厘米,先端短尖,基部楔形至阔楔形而下延至叶柄,全缘或每边具不规则的波状粗齿,光滑或两面均被稀疏短柔毛,叶脉每边5—6条,叶柄长约1—2厘米。蝎尾状花序腋外生,由3—6—(10)花组成,总花梗长约1—2.5厘米,花梗长约5毫米,近无毛或具短柔毛;萼小,浅杯状,直径约1.5—2毫米,齿卵圆形,先端圆,基部两齿间连接处成角度;花冠白色,筒部隐于萼内,长不及1毫米,冠檐长约2.5毫米,5深裂,裂片卵圆形,长约2毫米;花丝短,花药黄色,长约1.2毫米,约为花丝长度的4倍,顶孔向内;子房卵形,直径约0.5毫米,花柱长约1.5毫米,中部以下被白色绒毛,柱头小,头状。浆果球形,直径约8毫米,熟时黑色。种子多数,近卵形,直径约1.5—2毫米,两侧压扁。

我国几乎全国均有分布。喜生于田边,荒地及村庄附近。广泛分布于欧、亚、美洲的温带至热带地区。

全株入药,可散瘀消肿,清热解毒。

4b. 矮株龙葵(变种)

var. *humile* (Bernh.) C. Y. Wu et S. C. Huang 植物分类学报, 16



图版19: 1—6.龙葵 *Solanum nigrum* L. 1.植株上部; 2.花, 3.花萼展开; 4.花冠展开;
5.雄蕊; 6.雌蕊。7.旋花茄 *S. spirale* Roxb. 花枝一部分示花序及叶。8.珊瑚樱 *S. pseudocapsicum* L. 果枝一部分示果及叶。(曾孝濂 张泰利绘)