

5b. 紫少花龙葵(变种)

var. *violaceum* (Chen) C. Y. Wu et S. C. Huang, 植物分类学报, 16 (2); 72. 1978.——*S. nigrum* L. var. *violaceum* Chen ined.? ex Wessely in Fedde, Repert. 63 (3): 293. 1960.

与少花龙葵的主要区别是本变种的花为紫色。见到产于四川巫山, 城口的标本。

本变种是否即陈氏所发表者, 尚不可知, 因参考资料不全, 原发表文献未找到, 兹仅依据 Wessely 记载, 移此作为一变种。

6. 红果龙葵 红葵 (刘慎谔)

Solanum alatum Moench, Meth. Pl. 474. 1794; Pojark. in Schischk. Fl. URSS 22: 33. 1955; Wessely in Fedde, Repert. 63 (3): 313. 1960.——*S. miniatum* Bernh. in Willd. Enum. hort. Berol. 1: 236. 1809; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 56. 1852.

直立草本, 高约 40 厘米, 多分枝, 小枝被糙伏毛状短柔毛并具有棱角状的狭翅, 翅上具瘤状突起。叶卵形至椭圆形, 长 2—5.5 厘米, 宽 1—3 厘米, 先端尖, 基部楔形下延, 边缘近全缘, 浅波状或基部 1—2 齿, 很少有 3—4 齿, 两面均疏被短柔毛; 叶柄具狭翅, 长 5—8 毫米, 被有与叶面相同的毛被。花序近伞形, 腋外生, 被微柔毛或近无毛, 总花梗长约 1 厘米, 花梗长约 5 毫米, 花紫色, 直径约 7 毫米, 萼杯状, 直径约 2 毫米, 外面被微柔毛, 萼齿 5, 近三角形, 长不及 1 毫米, 先端钝, 基部两萼齿间连接处成弧形, 花冠筒隐于萼内, 长约 1 毫米, 冠檐长约 5 毫米, 5 裂, 裂片卵状披针形, 长约 3 毫米, 边缘被绒毛; 花丝长约 0.5 毫米, 花药黄色, 长约 1.5 毫米, 顶孔向内; 子房近圆形, 直径约 0.5 毫米, 花柱丝状, 长约 3 毫米, 中部以下被白色绒毛, 柱头头状。浆果球状, 朱红色, 直径约 6 毫米; 种子近卵形, 两侧压扁, 直径约 1 毫米。 花果期夏秋。

产河北(栽培)、山西、甘肃、新疆、青海诸省。生长于山坡及山谷阴处或路旁, 海拔 950—1200 米。也分布于欧洲。

7. 木龙葵 白花仔草(香港大鱼山)

Solanum suffruticosum Schousb. in Willd. Enum. hort. Berol. 1: 236. 1809, Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 53. 1852.

7a. 木龙葵(原变种)

var. *suffruticosum*

茎直立, 灌木状, 上部多分枝, 扁或四棱形, 小枝幼时被弯卷的短柔毛, 后逐渐脱落, 枝沿棱角下延成狭翅, 翅上具齿。叶卵形至菱状卵形, 通常长 1.5—3.5 厘米, 宽