

1—1.5 厘米，先端尖，基部楔形下延到叶柄，边缘浅波状，具缘毛，两面近无毛或具短柔毛，侧脉每边 3—4 条；叶柄长约 4—7 毫米，具狭翅。伞状聚伞花序（少有聚伞式圆锥花序）腋外生，具微柔毛，花较多或仅 3—5 朵，总花梗长约 1—2.5 厘米，花梗长约 5 毫米，因总轴的极端紧缩而几相互靠接，花小，白色，有时为红色，直径约 5 毫米；萼杯状，直径约 2 毫米，外面被微柔毛，萼齿 5 枚，三角状卵形，先端钝，长约 0.5 毫米，花冠筒隐于萼内，长不到 1 毫米，冠檐长约 3 毫米，5 裂，裂片卵形，长约 2.5 毫米；花丝短，花药黄色，长约 1.5 毫米，约为花丝长度的 4 倍，顶孔向内；子房圆形，直径约 1 毫米，花柱长约 3 毫米，中部以下被白色绒毛，柱头头状。浆果球状，黑色，直径约 5 毫米；种子近卵形，两侧压扁，直径约 0.8—1 毫米。 全年开花结果。

产云南、贵州、广西、广东、湖南、江西、福建、台湾诸省。生长于路旁，沟谷阴湿处，海拔 750—1600 米。欧洲（西班牙南部），非洲（埃及），阿拉伯至印度均有分布。

7b. 光枝木龙葵(变种)

var. *merrillianum* (Liou) C. Y. Wu et S. C. Huang 海南植物志 3: 586. 1974.——*S. merrillianum* Liou in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 3: 455. 1935.

与木龙葵的主要区别为茎的木质化程度较弱，扁或圆形，枝沿棱角不具齿；花序常分枝。

产广东。

组 4. 珊瑚樱组

Sect. 4. *Pseudo-capsicum* (Dunal) Bitter in Engl. Bot. Jahrb. 54: 497. 1917 sensu stricto, et in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Europ. 5 (4): 2583. 1927.——Sect. I. *Pachystemonum* Dunal Subsect. IV. *Micranthes* Dunal 2° *Anthopleuris* Dunal § 2. *Pseudo-capsicum* Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 29. 1852.

花序多半少花或多单生，侧生腋外生近对叶生，然而不正对叶，无总花梗或近无总花梗，通常仅最下面一花或数花发育成果；花冠白色，相当小，星状或星状辐形；花丝短，无毛；花药短，椭圆形，长过于宽 2 倍或 3 倍，具顶生内向的斜孔；花柱无毛。浆果圆球状，中等大，亮红色，无石细胞粒。小灌木或半灌木，具单生披针形全缘或微波状的叶片。

我国有 1 种及 1 变种。