

1890, p. p.; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 564. 1900; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. Ser. 10: 183. 1912.

草质藤本，多分枝，长0.5—3米，茎、叶各部密被多节的长柔毛。叶互生，多数为心脏形，长1.5—5—(7)厘米，宽1—3.5厘米，先端尖或渐尖，基部心脏形或戟形，边全缘，少数基部3深裂，裂片全缘，侧裂片短而端钝，中裂片长，卵形至卵状披针形，先端渐尖，上面疏被白色发亮的短柔毛，下面与上面的毛被相似，唯较密，中脉明显，侧脉纤细，每边4—6条；叶柄长约1—2厘米，密被多节的长柔毛。聚伞花序顶生或腋外生，疏花，总花梗长约1.8—4厘米，被多节发亮的长柔毛及短柔毛，花梗长约0.8—1厘米，顶端稍膨大，基部具关节，无毛；萼杯状，直径约4毫米，无毛，萼齿5枚，圆形，顶端短尖，长不及1毫米；花冠蓝紫色或白色，直径约1厘米，开放时裂片向外反折，花冠筒隐于萼内，长约1毫米，冠檐长约6毫米，5裂，裂片椭圆状披针形，长约4毫米，宽约2毫米；花丝长不到1毫米，花药长圆形，长约3毫米，顶孔略向内；子房卵形，直径约1毫米，花柱丝状，长约6毫米，柱头小，头状。浆果成熟时红色，直径约8毫米，果柄无毛，常作弧形弯曲；种子近圆形，两侧压扁，直径约1.5毫米，外面具细致凸起的网纹。花期夏秋间，果期秋末。

产陕西、甘肃、河南、山东、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、云南、广西、广东诸省。常生于灌木丛中，山谷及山坡等阴湿处。海拔500—1250米，其他环境及130—1950米处也间有生长。

茎入药，可治小儿惊风。枝、叶有清血之效。

13. 白英(植物名实图考) 山甜菜(同前书)；蔓茄(陕西丹凤)；北风藤(四川南川)；白英(杭州，白英之误)；生毛鸡屎藤(广东云浮) 图版23: 1—3

Solanum lyratum Thunb. Fl. Japon. 92. 1784. et Icon. Pl. Japon. 5. f. 2. 1805.—*S. dulcamara* L. var. *pubescens* Blume, Bijdr. 698. 1825; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 8: 195. 1927; Hand.-Mzt. Symb. Sin. 7: 827. 1936.—*S. dulcamara* L. var. *lyratum* (Thunb.) Sieb. et Zucc. ex Bonati in Lecte. Fl. Gén. L'Indo-Chine 4: 317. 1915 p. p.

S. dulcamara auct. non L.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 169. 1890, p. p.; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 564. 1900, p. p.; Lévl. in Bull. Soc. Bot. France 55: 205. 1908, p. p.; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. Ser. 10: 183. 1912; Hand.-Mzt. Symb. Sin. 7: 827. 1936 p. p.

草质藤本，长0.5—1米，茎及小枝均密被具节长柔毛。叶互生，多数为琴形，长

3.5—5.5 厘米, 宽 2.5—4.8 厘米, 基部常 3—5 深裂, 裂片全缘, 侧裂片愈近基部的愈小, 端钝, 中裂片较大, 通常卵形, 先端渐尖, 两面均被白色发亮的长柔毛, 中脉明显, 侧脉在下面较清晰, 通常每边 5—7 条; 少数在小枝上部的为心脏形, 小, 长约 1—2 厘米; 叶柄长约 1—3 厘米, 被有与茎枝相同的毛被。聚伞花序顶生或腋外生, 疏花, 总花梗长约 2—2.5 厘米, 被具节的长柔毛, 花梗长 0.8—1.5 厘米, 无毛, 顶端稍膨大, 基部具关节; 萼环状, 直径约 3 毫米, 无毛, 萼齿 5 枚, 圆形, 顶端具短尖头; 花冠蓝紫色或白色, 直径约 1.1 厘米, 花冠筒隐于萼内, 长约 1 毫米, 冠檐长约 6.5 毫米, 5 深裂, 裂片椭圆状披针形, 长约 4.5 毫米, 先端被微柔毛; 花丝长约 1 毫米, 花药长圆形, 长约 3 毫米, 顶孔略向上; 子房卵形, 直径不及 1 毫米, 花柱丝状, 长约 6 毫米, 柱头小, 头状。浆果球状, 成熟时红黑色, 直径约 8 毫米; 种子近盘状, 扁平, 直径约 1.5 毫米。 花期夏秋, 果熟期秋末。

产甘肃、陕西、山西、河南、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、广东、广西、湖南、湖北、四川、云南诸省。喜生于山谷草地或路旁、田边, 海拔 600—2800 米。日本、朝鲜、中南半岛也有分布。

全草入药, 可治小儿惊风。果实能治风火牙痛。

14. 野海茄(广西田林) 图版 21: 8—14

Solanum japonense Nakai, Fl. Sylvat. Koreana 14: 58. 1923.—*S. dulcamara* L. var. *heterophyllum* Makino in Bot. Mag. Tokyo 24: 19. 1910.—*S. nippone* Makino in Journ. Jap. Bot. 3: 20. 1926, et Illustr. Fl. Jap. 156, f. 468. 1953.

S. gracilescens auct. non Nakai ex Makino; Nakai, Bot. Mag. Tokyo 44: 534. 1930.

草质藤本, 长 0.5—1.2 米, 无毛或小枝被疏柔毛。叶三角状宽披针形或卵状披针形, 通常长 3—8.5 厘米, 宽 2—5 厘米, 先端长渐尖, 基部圆或楔形, 边缘波状, 有时 3—(5) 裂, 侧裂片短而钝, 中裂片卵状披针形, 先端长渐尖, 无毛或在两面均被具节疏柔毛或仅脉上被疏柔毛, 中脉明显, 侧脉纤细, 通常每边 5 条; 在小枝上部的叶较小, 卵状披针形, 长约 2—3 厘米; 叶柄长 0.5—2.5 厘米, 无毛或具疏柔毛。聚伞花序顶生或腋外生, 疏毛, 总花梗长 1—1.5 厘米, 近无毛, 花梗长 6—8 毫米, 无毛, 顶端稍膨大; 萼浅杯状, 直径约 2.5 毫米, 5 裂, 萼齿三角形, 长约 0.5 毫米; 花冠紫色, 直径约 1 厘米, 花冠筒隐于萼内, 长不及 1 毫米, 冠檐长约 5 毫米, 基部具 5 个绿色的斑点, 先端 5 深裂, 裂片披针形, 长 4 毫米; 花丝长约 0.5 毫米, 花药长圆形, 长 2.5—3 毫米。



图版 23: 1—3.白英 *Solanum lyratum* Thunb., 1.植株一部分; 2.花冠展开去雄蕊; 3.果。4—6.青杞 *S. septemlobum* Bunge, 4.花枝; 5.花冠展开去雄蕊; 6.果。7—10.阳芋 *S. tuberosum* L., 7.叶; 8.花冠展开去雄蕊; 9.花序; 10.块茎。(张泰利绘)