

1939.——*S. morrisonense* Hayata, Gen. Ind. Fl. Form. 52: 1917; Sasaki, List Pl. Form. 364. 1928, et Cat. Governm. Herb. 451. 1930, nom. nud., fide photo. Y. Tsiang Herb. 23180.

草本，茎中空，外面具棱角，近无毛或具微柔毛。叶卵状披针形，茎下部叶与茎端及小枝的叶的大小悬殊极大，茎下部叶长3—5厘米，宽1—2.4厘米，先端渐尖，基部圆形稍偏斜，边全缘或啮蚀状，上面被具节的微柔毛，下面近于无毛，侧脉每边7—8条；叶柄纤细，长约0.8—1.2厘米，被微柔毛；茎端及小枝的叶小，长约1.5—1.8厘米，宽约6毫米，其他特征与茎下部叶相同。聚伞花序腋外生，疏散，总花梗长约2厘米，被微柔毛，花梗长约1厘米，无毛，萼杯状，直径约2.5毫米，5浅裂，萼齿卵圆形具凸尖，外面具分散的微柔毛；花冠筒隐于萼内，长约0.8毫米，冠檐长约4毫米，5深裂，裂片披针形，长约3毫米，宽约1.3毫米，基部具2斑点，外面边缘及先端被短柔毛；花丝长约0.6毫米，花药长2毫米，宽约0.5毫米，顶孔向内；子房卵形，无毛，直径约1毫米，花柱纤细，长约4毫米，柱头头状，有时弯向下。浆果球状，直径约5—6毫米，具有向外开张的宿萼，果柄长约1.2—1.5厘米，上端稍膨大；种子近圆形，两侧压扁，直径约1.5毫米。

仅见于我国台湾省。

组6. 青杞组

Sect. 6. *Polybotryon* (Dunal) Bitter in Fedde Repert. 11: 10, 469. 1912.——Sect. I. *Pachystemonum* Dunal Subsect. III. *Dulcamara* Dunal * * *Polybotryon* Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 28, 66. 1852.——Subg. I. *Eusolanum* Bitter Sect. 2. *Dulcamara* (Dunal) Bitter Ser. 2. *Septemloba* Pojark. in Schischk. Fl. URSS 22: 11. 1955.

聚伞花序总状，近腋生，丛生，多花或单花，有时对叶生。花冠五角形，折叠状，5深裂或5半裂，青紫色或白色。果圆形及卵圆形。叶奇数羽状分裂，裂片全缘，常渐尖或简单不裂。中南美约30余种。我国有3种。

17. 南青杞 玲珑茄(云南西双版纳勐仑) 图版22: 1

Solanum kerrii Bonati in Bull. Soc. Bot. Gèneve, ser. 2. 5: 310. 1913, et in Lecte. Fl. Gén. L'Indo-Chine 4: 317. 1915.

S. seaforthianum auct. non Andr.; Craib. in Contr. Fl. Siam. Dicotyl. 143. 1911; 侯宽昭等，广州植物志，573. 1956.

无刺木质藤本，高达1米，近无毛。叶互生，长宽均约4—8厘米，羽状5—9裂，以7裂的最多，裂片全缘，互生，卵形至长圆形，长1.5—4.5厘米，宽0.5—2厘米，先端渐尖或短尖，基部不相等，两面均在脉上被尘土色的微柔毛，在上端的无柄，贴生于中脉上，下端的具长约3毫米的短柄或无柄，总叶柄长1.8—4厘米，具微柔毛。聚伞式圆锥花序顶生或对叶生，无毛，多花，总花梗长达4厘米，长于或等于叶柄，花梗长约1厘米，顶端稍膨大；萼小，杯状，直径1.5毫米，5浅裂，裂片不明显，成三角状凸起；花冠紫色，整齐，花冠筒长约1.5毫米，冠檐长约8—11毫米，5深裂，裂片卵状长圆形、长约5—8毫米，宽约2.5—4.5毫米、无毛；花丝长约2—3毫米，光滑，花药长约3—4毫米，顶孔向内，花柱光滑，丝状，长达1毫米，柱头头状。果未见。

野生于云南东南部(蒙自)，路旁海拔1300米处。此外云南西双版纳勐仑植物园及广州市植物园均引种栽培。泰国亦有分布。

云南及广东的栽培种均曾定名为 *S. seaforthianum* Andr. 但就其外部形态及花的解剖看均与云南东南部所产的野生种 *S. Kerrii* Bonati 无多大差异，且根据 Bot. Mag. X, v. (1818) f. 1982 及 Cyclop. Hort. III (1929—30) 3185 的记载 *S. seaforthianum* Andr. 的茎的上部叶均为单叶或为三小叶，从不为羽状复叶，而花序疏散下垂，这些特征均与本种相差很大。

18. 青杞(救荒本草) 蜀羊泉(植物名实图考)；野枸杞(内蒙锡盟；陕西绥德)；野茄子(河北；陕西吴起，靖边)；枸杞子(河北小五台山) 图版 23: 4—6

Solanum septemlobum Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 2: 122. 1833; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 172. 1890.

18a. 青杞(原变种)

var. *septemlobum*

直立草本或灌木状，茎具棱角，被白色具节弯卷的短柔毛至近于无毛。叶互生，卵形，长3—7厘米，宽2—5厘米，先端钝，基部楔形，通常7裂，有时5—6裂或上部的近全缘，裂片卵状长圆形至披针形，全缘或具尖齿，两面均疏被短柔毛，在中脉，侧脉及边缘上较密；叶柄长约1—2厘米，被有与茎相似的毛被。二歧聚伞花序，顶生或腋外生，总花梗长约1—2.5厘米，具微柔毛或近无毛，花梗纤细，长5—8毫米，近无毛，基部具关节；萼小，杯状，直径约2毫米，外面被疏柔毛，5裂，萼齿三角形，长不到1毫米；花冠青紫色，直径约1厘米，花冠筒隐于萼内，长约1毫米，冠檐长约7毫米，先端深5裂，裂片长圆形，长约5毫米，开放时常向外反折；花丝长不及1毫米，花药黄色，长圆形，长约4毫米，顶孔向内；子房卵形，直径约1.5毫米，花柱丝状，长约7



图版 22; 1.南青杞 *Solanum kerrii* Bonati, 花枝。 2—4.茄子蒿 *S. septemlobum* Bunge var. *indutum* Hand.- Mzt. 2.果枝; 3.叶一部分放大; 4.茎一部分放大。(肖溶绘)