

无刺木质藤本，高达1米，近无毛。叶互生，长宽均约4—8厘米，羽状5—9裂，以7裂的最多，裂片全缘，互生，卵形至长圆形，长1.5—4.5厘米，宽0.5—2厘米，先端渐尖或短尖，基部不相等，两面均在脉上被尘土色的微柔毛，在上端的无柄，贴生于中脉上，下端的具长约3毫米的短柄或无柄，总叶柄长1.8—4厘米，具微柔毛。聚伞式圆锥花序顶生或对叶生，无毛，多花，总花梗长达4厘米，长于或等于叶柄，花梗长约1厘米，顶端稍膨大；萼小，杯状，直径1.5毫米，5浅裂，裂片不明显，成三角状凸起；花冠紫色，整齐，花冠筒长约1.5毫米，冠檐长约8—11毫米，5深裂，裂片卵状长圆形、长约5—8毫米，宽约2.5—4.5毫米、无毛；花丝长约2—3毫米，光滑，花药长约3—4毫米，顶孔向内，花柱光滑，丝状，长达1毫米，柱头头状。果未见。

野生于云南东南部(蒙自)，路旁海拔1300米处。此外云南西双版纳勐仑植物园及广州市植物园均引种栽培。泰国亦有分布。

云南及广东的栽培种均曾定名为 *S. seaforthianum* Andr. 但就其外部形态及花的解剖看均与云南东南部所产的野生种 *S. Kerrii Bonati* 无多大差异，且根据 Bot. Mag. X, v. (1818) f. 1982 及 Cyclop. Hort. III (1929—30) 3185 的记载 *S. seaforthoanum* Andr. 的茎的上部叶均为单叶或为三小叶，从不为羽状复叶，而花序疏散下垂，这些特征均与本种相差很大。

18. 青杞(救荒本草) 蜀羊泉(植物名实图考);野狗杞(内蒙锡盟;陕西绥德);野茄子(河北;陕西吴起,靖边);枸杞子(河北小五台山) 图版 23: 4—6

*Solanum septemlobum* Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 2: 122. 1833; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 172. 1890.

18a. 青杞(原变种)

var. *septemlobum*

直立草本或灌木状，茎具棱角，被白色具节弯卷的短柔毛至近于无毛。叶互生，卵形，长3—7厘米，宽2—5厘米，先端钝，基部楔形，通常7裂，有时5—6裂或上部的近全缘，裂片卵状长圆形至披针形，全缘或具尖齿，两面均疏被短柔毛，在中脉，侧脉及边缘上较密；叶柄长约1—2厘米，被有与茎相似的毛被。二歧聚伞花序，顶生或腋外生，总花梗长约1—2.5厘米，具微柔毛或近无毛，花梗纤细，长5—8毫米，近无毛，基部具关节；萼小，杯状，直径约2毫米，外面被疏柔毛，5裂，萼齿三角形，长不到1毫米；花冠青紫色，直径约1厘米，花冠筒隐于萼内，长约1毫米，冠檐长约7毫米，先端深5裂，裂片长圆形，长约5毫米，开放时常向外反折；花丝长不及1毫米，花药黄色，长圆形，长约4毫米，顶孔向内；子房卵形，直径约1.5毫米，花柱丝状，长约7



图版 23: 1—3.白英 *Solanum lyratum* Thunb., 1.植株一部分; 2.花冠展开去雌蕊; 3.果。4—6.青杞 *S. septemlobum* Bunge, 4.花枝; 5.花冠展开去雌蕊; 6.果。7—10.阳芋 *S. tuberosum* L., 7.叶; 8.花冠展开去雌蕊; 9.花序; 10.块茎。(张泰利绘)