

木,大多具刺,几永远被以星状毛,稀无毛或仅见单毛。

组 8. 水茄组

Sect. 8. *Torvaria* (Dunal) Bitter in Engl. Bot. Jahrb. 57: 250. 1922, sensu. stricto. cum Ser. I. *Eutoroum* Bitter l. c. 251.—Sect. II. *Leptostemonum* Dunal Subsect. II. *Torvaria* Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 30, 258. 1852.

花序侧生,与叶远离,多花,花梗短或较长(绝不太短缩),大多多次分枝,因而花序平顶且相当密。花冠星形或辐状星形,直径约 1.1—3.5 厘米,子房及花柱均无毛,花全部或几全部两性而能孕,因而在任何花序中均产生多果。浆果圆球状,小或中等大。灌木几永远大或乔木状,稀无刺,大多具粗壮的刺或较少具相当细密的刺,大多密生星状绒毛,稀趋于稀少。叶片中等大或大,形状相当变化,时而宽披针形全缘,时而宽椭圆形或卵圆形或宽卵圆心脏形,多少具浅波状圆裂,有时裂片再作浅圆裂。

泛热带许多种。我国有 4 种。


20. **水茄** 山颠茄(广东宝安);金衫扣(两广);野茄子(云南金平、河口);刺茄(金平);西好、青茄(河口);乌凉(云南思茅);木哈蒿(傣语);天茄子(贵州兴义);刺番茄(贵州独山)。图版 26: 7—8

***Solanum torvum* Swartz, Prodr. Fl. Ind. Occ. 47. 1788, et Fl. Ind. Occ. 1: 456. 1787; Dunal, Solan. 263, f. 23. 1816, et in DC. Prodr. 13(1): 260. 1852, excl. var.**

20a. **水茄**(原变种)

var. *torvum*

灌木,高 1—2—(3) 米,小枝,叶下面,叶柄及花序柄均被具长柄,短柄或无柄稍不等长 5—9 分枝的尘土色星状毛。小枝疏具基部宽扁的皮刺,皮刺淡黄色,基部疏被星状毛,长 2.5—10 毫米,宽 2—10 毫米,尖端略弯曲。叶单生或双生,卵形至椭圆形,长 6—12—(19) 厘米,宽 4—9—(13) 厘米,先端尖,基部心脏形或楔形,两边不相等,边缘半裂或作波状,裂片通常 5—7,上面绿色,毛被较下面薄,分枝少(5—7)的无柄的星状毛较多,分枝多的有柄的星状毛较少,下面灰绿,密被分枝多而具柄的星状毛;中脉在下面少刺或无刺,侧脉每边 3—5 条,有刺或无刺。叶柄长约 2—4 厘米,具 1—2 枚皮刺或不具。伞房花序腋外生,2—3 歧,毛被厚,总花梗长 1—1.5 厘米,具 1 细直刺或无,花梗长约 5—10 毫米,被腺毛及星状毛;花白色;萼杯状,长约 4 毫



图版 26: 1—6. 刺天茄 *Solanum indicum* Linn., 1. 花枝; 2. 花冠内面; 3. 花萼及子房; 4. 果; 5. 叶上面毛放大; 6. 叶背面毛放大。 7—8. 水茄 *S. torvum* Swartz, 7. 花枝; 8. 果。 9. 红茄 *S. integrifolium* Poir. 果。(王利生, 张泰利绘)