

约 6 毫米,子房球形,顶端被星状毛及微柔毛,花柱丝状,长 8 毫米,中部以下疏被星状毛及微柔毛。浆果红色,球形,直径约 6—8 毫米,种子圆形压扁,直径约 1.5 毫米。全年开花结果。

产两广及海南。喜生于旷野荒地及空旷灌木丛中。

22. **疏刺茄** 图版 24: 1—3

Solanum nienkui Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 318, f. 44. 1935; Masamune, Fl. Kainant. 295. 1943.

直立灌木,高 0.5—1 米,茎光滑,木质,嫩枝常被星状短柔毛,无刺或具长约 1 毫米的小钩刺,渐老则逐渐光滑。叶卵形至长圆状卵形,长 3—7 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端尖或钝,基部圆形或楔形,两侧不相等,边缘近波状,上面绿色,被 5—7 分枝粗短的或近无柄的星状毛,下面淡绿,密被 7—9 分枝细长具柄而互相交织的星状短柔毛,中脉在上面略下凹,有时具有极小的钩刺,侧脉每边 4—5 条,在两面均明显;叶柄长 1.5—2 厘米,密被与叶下面相似的星状毛,无刺或具极小的钩刺。蝎尾状花序顶生或腋外生,长 3—6 厘米,花梗长约 1 厘米,毛被与叶下面的相似,花萼钟状,直径约 6 毫米,外面密被具短柄分枝多的星状短柔毛,端 5 裂,裂片长圆状卵形,长约 1.5—2 毫米,先端渐尖,花冠蓝紫色,辐形,直径约 1.3 厘米,外面被星状毛,花冠筒长约 1.5 毫米,冠檐长约 10 毫米,先端 5 裂,裂片三角形,长约 5 毫米,宽约 4 毫米,先端尖,通常 3 长 2 短,长的连花丝约长 7 毫米,花药黄色,长约 6 毫米,先端延长,渐尖,花丝长约为花药长度的 $1/6$;子房长圆形,光滑,花柱纤长,丝状,长约 7 毫米,柱头小,先端浅 2 裂。浆果圆球形,直径约 1 厘米,光滑,果柄长约 1.2 厘米,被星状毛,上端膨大;种子扁,近肾形,直径约 1.5—2 毫米,外面具网纹。花期 6—12 月。

我国广东海南特产。喜生于林下或灌木丛中,海拔约 250 米。

23. **海南茄** 细颠茄;金纽头;卜古笏;卜古雀;衫纽藤(海南儋县);鸡公箭子(澄迈);耳环草(广东茂名);小丁茄(徐闻) 图版 24: 4—6

Solanum procumbens Lour. Fl. Cochinch. 1: 132. 1790; Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. n. s. 24 (2): 348. 1935—*S. hainanense* Hance in Journ. Bot. 5: 331. 1868; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 170. 1890; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 164. 1927.

灌木高 1—2 米,直立或平卧,多分枝,小枝无毛,具黄土色基部宽扁的倒钩刺,刺长约 2—4 毫米,基部宽约 1.5—4 毫米,端尖,微弯,褐黄色;嫩枝,叶下面,叶柄及花序柄均被分枝多,无柄或具短柄的星状短绒毛及小钩刺。叶卵形至长圆形,长 2—6



图版 24: 1—3. 疏刺茄 *Solanum nienkui* Merr. et Chun, 1. 花枝; 2. 叶上面一部分放大; 3. 茎一部分放大。 4—6. 海南茄 *S. procumbens* Lour., 4. 花枝; 5. 叶上面一部分放大; 6. 茎一部分放大。(李锡畴绘)