

印度、非洲多种。我国有 3 种。

24. 刺天茄 (滇南本草、植物名实图考) 苦果 (云南禄丰、屏边); 苦天茄 (云南砚山); “歌温喝”、“傻里布”(傣语); 野海椒 (四川盐边); 颠茄 (四川雷波、广西南宁); 钉茄 (广西梧州); 丁茄子 (广西绥淦); 袖扣果 (广西龙州); 生刺矮瓜 (广东信谊); 紫花茄 (广州植物志); 鸡刺子 (海南琼山); 黄水莽 (台湾省) 图版 26:1—6


*Solanum indicum* L. Sp. Pl. ed. 1. 187. 1753, p. p.; sensu Nees in Trans. Linn. Soc. 17: 55. 1837; Wight, Icon. Pl. Ind. Or. 2: f. 346. 1840—43; Hand.-Mzt., Symb. Sin. 7: 828. 1936; Tanaka et Odash., Census 381. 1938, et in l. c. Suppl. 201. 1940; Masamune, Kainant. 295. 1943.—*S. chinense* Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 373. 1852.

24a. 刺天茄 (原变种)

var. *indicum*

多枝灌木, 通常高 0.5—1.5—(6) 米, 小枝, 叶下面, 叶柄, 花序均密被 8—11 分枝, 长短不相等的具柄的星状绒毛。小枝褐色, 密被尘土色渐老逐渐脱落的星状绒毛及基部宽扁的淡黄色钩刺, 钩刺长 4—7 毫米, 基部宽 1.5—7 毫米, 基部被星状绒毛, 先端弯曲, 褐色。叶卵形, 长 5—7—(11) 厘米, 宽 2.5—5.2—(8.5) 厘米, 先端钝, 基部心形, 截形或不相等, 边缘 5—7 深裂或成波状浅圆裂, 裂片边缘有时又作波状浅裂, 上面绿色, 被具短柄的 5—9—(11) 分枝的星状短绒毛, 下面灰绿, 密被星状长绒毛; 中脉及侧脉常在两面具有长 2—6 毫米的钻形皮刺, 侧脉每边 3—4 条; 叶柄长 2—4 厘米, 密被星状毛及具 1—2 枚钻形皮刺, 有时不具。蝎尾状花序腋外生, 长约 3.5—6 厘米, 总花梗长 2—8 毫米, 花梗长 1.5 厘米或稍长, 密被星状绒毛及钻形细直刺; 花蓝紫色, 或少为白色, 直径约 2 厘米; 萼杯状, 直径约 1 厘米, 长约 4—6 毫米, 先端 5 裂, 裂片卵形, 端尖, 外面密被星状绒毛及细直刺, 内面仅先端被星状毛; 花冠辐状, 筒部长约 1.5 毫米, 隐于萼内, 冠檐长约 1.3 厘米, 先端深 5 裂, 裂片卵形, 长约 8 毫米, 外面密被分枝多具柄或无柄的星状绒毛, 内面上部及中脉疏被分枝少无柄的星状绒毛, 很少有与外面相同的星状毛; 花丝长约 1 毫米, 基部稍宽大, 花药黄色, 长约为花丝长度的 7 倍, 顶孔向上; 子房长圆形, 具棱, 顶端被星状绒毛, 花柱丝状, 长约 8 毫米, 除柱头以下 1 毫米外余均被星状绒毛, 柱头截形。果序长约 4—7 厘米, 果柄长 1—1.2 厘米, 被星状毛及直刺。浆果球形, 光亮, 成熟时橙红色, 直径约 1 厘米, 宿存萼反卷。种子淡黄色, 近盘状, 直径约 2 毫米。全年开花结果。

产四川、贵州、云南、广西、广东、福建、台湾, 海拔 180—1700 米的林下、路边、荒



图版 26: 1—6. 刺天茄 *Solanum indicum* Linn., 1. 花枝; 2. 花冠内面; 3. 花萼及子房; 4. 果; 5. 叶上面毛放大; 6. 叶背面毛放大。 7—8. 水茄 *S. torvum* Swartz, 7. 花枝; 8. 果。 9. 红茄 *S. integrifolium* Poir. 果。(王利生, 张泰利绘)