

-8. **截萼红丝线** *L. subtruncata* (Wall.) Bitter
 2. 花序仅具 1 花, 亚灌木, 小枝、叶柄及果柄均被柔毛及 2 分叉的星状柔毛, 萼齿 10, 直立.....
2. **单果红丝线** *L. solitaria* C. Y. Wu et A. M. Lu ex Wu et Huang
 1. 多年生草本具匍匐茎, 常在节上生不定根。花序仅具 1 花。.....
9. **单花红丝线** *L. lysimachioides* (Wall.) Bitter

系 1. 直立系

Ser. 1. Erectae Bitter in Abh. Naturw ver. Bremen 25: 460. 1919.

花序通常 1—7 花 (我国产的种类), 较少多到 20—30 朵 (美洲产的种类); 在同一植株上, 花序决无单花的 (我国产少数种除外); 花药常分离。直立亚灌木, 灌木或草本, 决不匍匐。


1. **红丝线** (植物名实图考) 十萼茄 (广州植物志); 衫钮子 (广西临桂); 野灯笼花 (广西大苗山县); 血见愁 (植物名实图考); 野花毛辣角 (贵州独山) 图版 30: 1—8

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter in Abh. Naturw. Ver. Bremen 25: 461. 1919.—*Solanum biflorum* Lour., Fl. Coch. 1: 129. 1790, et 159. 1793; Dunal, Hist. Sol. 177. 1813, et in DC. Prodr. 13 (1): 178. 1852; Masamune, Mem. Fac. Sic. Agr. Tashoku Univ. 11: 400. 1934, et Fl. Kainant. 294. 1943.—*S. decemdentatum* Roxb., Hort. Beng. 16. 1814, et Fl. Ind. 2: 247. 1824; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 179. 1852; Benth. Fl. Hongk. 242. 1861; Warb. in Engl. Bot. Jahrb. 13: 415. 1891.—*S. decemfidum* Nees in Trans. Linn. Soc. 17: 43. 1837.—*S. calleryanum* Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 178. 1852.

1a. **红丝线** (原变种)

var. **biflora**

灌木或亚灌木, 高 0.5—1.5 米, 小枝、叶下面、叶柄、花梗及萼的外面密被淡黄色的单毛及 1—2 分枝或树枝状分枝的绒毛。上部叶常假双生, 大小不相等; 大叶片椭圆状卵形, 偏斜, 先端渐尖, 基部楔形渐窄至叶柄而成窄翅, 长约 9—13—15 厘米, 宽约 3.5—5—7 厘米; 叶柄长约 2—4 厘米; 小叶片宽卵形, 先端短渐尖, 基部宽圆形而后骤窄下延至柄而成窄翅, 长 2.5—4 厘米, 宽 2—3 厘米; 叶柄长约 0.5—1 厘米, 两种叶均膜质, 全缘, 上面绿色, 被简单具节分散的短柔毛; 下面灰绿色。花序无柄, 通常 2—3 朵少 4—5 朵花着生于叶腋内; 花梗短, 约 5—8 毫米; 萼杯状, 长约 3 毫米, 直径约 3.5 毫米, 萼齿 10, 钻状线形, 长约 2 毫米, 两面均被有与萼外面相同的毛被; 花



图版30: 1—8. 红丝线 *Lycianthes biflora* (Lour.) Bitter, 1. 花枝; 2. 茎一部分放大; 3. 叶上面一部分放大; 4. 叶背面一部分放大; 5. 花萼内面; 6. 花冠内面; 7. 果; 8. 种子。(王利生绘)