

药用，有消肿之效。

9. 水八角属——*Gratiola* Linn.

Linn. Sp. Pl. 17. 1753.

直立或平卧肉质草本，无毛或被腺状柔毛。叶对生，无柄，全缘或有锯齿。花单生于叶腋，花梗极短或长而丝状，近萼处有小苞片2枚，形似萼裂片；花萼5深裂，萼裂片狭长，少许不等长，稍成覆瓦状排列；花冠2唇形，常为白色、黄色或紫红色，花冠筒筒状，唇开展，上唇全缘或2浅裂，下唇3裂，裂片圆形；雄蕊2，着生在花冠筒后方，内藏，花丝丝状，药室分离，平行而横向或垂直，退化雄蕊2或无，着生在花冠筒前方，内藏，丝状；花柱丝状，柱头扩大而外折或2片状，胚珠多数。蒴果卵珠形，通常顶端急尖，室背同室间开裂成4裂片，每片边缘内折与胎座柱分离；种子多数，小形，具条纹同横网纹。

本属约25种，主要分布于温带同亚热带地区。我国有2种，产东北至西南各省。

分 种 检 索 表

1. 具退化雄蕊；叶披针形或长椭圆形，具尖头；花白色或淡黄色（东北、江苏、江西、云南；朝鲜、日本、苏联）..... 1. 白花水八角 *G. japonica* Miq.
1. 无退化雄蕊；叶椭圆状矩圆形，钝头；花黄色（广东；热带及亚热带）..... 2. 黄花水八角 *G. griffithii* Hook. f.

1. 白花水八角 图34

Gratiola japonica Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2: 117. 1866; Kom. Acta Hort. Petrop. 25: 421. t. 5. f. 12—15; Gorskoba, in Fl. URSS 22: 323. 1955; 东北植物检索表 334. 图版114. 图4. 1959 (误写为图版113. 图8); 中国高等植物图鉴 4: 24. 图 5461. 1975.

一年生草本，无毛。根状茎细长，须状根密簇生。茎高8—25厘米，直立或上升，肉质，中下部有柔弱的分枝。叶基部半抱茎，长椭圆形至披针形，长7—23毫米，宽2—7毫米，顶端具尖头，全缘，不明显三出脉。花单生于叶腋，无柄或近于无柄；小苞片草质，条状披针形，长4—4.5毫米；花萼长3—4毫米，5深裂几达基部，萼裂片条状披针形至矩圆状披针形，具薄膜质的边缘；花冠稍2唇形，白色或带黄色，长约5—7毫米，花冠筒筒状较唇部长，长4—4.5毫米，上唇顶端钝或微凹，下唇3裂，裂片倒卵形，有时凹头；雄蕊2，位于上唇基部，药室略分离而并行，下唇基部有两枚短