

毫米，密被棕色梗毛；种子长约 0.5 毫米，黄色，表面粗糙。花果期 11 月至次年 3 月。

分布于云南、贵州、广西、广东、湖南、湖北。印度，缅甸，泰国及菲律宾也有。生于海拔 1200—2600 米的干山坡、岩缝及墙缝中。

### 13. 毛麝香属——*Adenosma* R. Br.

R. Br. Prodr. 442. 1810; Benth. et Hook. f. Gen. Pl.

949. 1876.

草本，直立或匍匐而下部节上生根，干时变黑，被多细胞长柔毛，常杂有腺毛，有芳香味。叶对生，有锯齿，被腺点。花具短梗或无梗，单生上部叶腋，常集成总状、穗状或头状花序；小苞片 2 枚；萼齿 5 枚，后方 1 枚通常较大；花冠筒状，裂片成二唇形，上唇直立，先端凹缺或全缘，下唇伸展，三裂；雄蕊 4 枚，二强，内藏；药室分离有短柄，前方一对花药的两药室中 1 室或 2 室均不发育，后方一对花药的两室均发育或有时只一室发育，不发育的药室小而中空；花柱顶端膨大，全缘或二裂。蒴果卵形或椭圆形，先端略具喙，室背与室间均开裂而成 4 片。种子小而多数，有网纹。

约 10 种，分布于亚洲东部和大洋洲。我国现有 4 种。本属植物含芳香油，大多可作药用。

### 分种检索表

1. 花单生叶腋或集成疏散的顶生总状花序。
  2. 茎直立。
    3. 植株高 30—100 厘米；下唇裂片全缘或微凹（江西南部、福建、广东、广西、云南）…………… 1. 毛麝香 *A. glutinosum* (L.) Druce
    3. 植株高 5—35 厘米；下唇裂片先端均有较深的凹缺或浅二裂（云南、广西）…………… 2. 凹裂毛麝香 *A. retusilobum* Tsoong et Chin
  2. 茎匍匐，下部节上生根（海南岛）…………… 3. 卵萼毛麝香 *A. javanicum* (Blume) Merr.
1. 花密集成顶生的头状或圆柱状的穗状花序（广东、广西、云南）…………… 4. 球花毛麝香 *A. indianum* (Lour.) Merr.

1. 毛麝香 图版 7: 1—4

*Adenosma glutinosum* (L.) Druce, Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.

3: 413. 1914; 广州植物志 593. 1956; 海南植物志 3: 500. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 20. 图 5454. 1975.——*Gerardia glutinosa* L. Sp. Pl. 611. 1753. ——