

1886.—*Vandellia setulosa* (Maxim.) Yamaz. Journ. Jap. Bot. 30: 174.
1955.

一年生草本，除幼苗外均多分枝；根向下分枝，并有多数须状支根；茎多分枝，大部倾卧多少蔓生，仅在基部1—3节上生根，较少上升至亚直立，多少方形，角上有翅状棱，面有条纹，疏布伸展之刺毛或近于无毛。叶有柄，柄长不超过3毫米；叶片宽卵形，长4—13毫米，宽3—4毫米，偶有宽过于长，顶端微尖，基部宽楔形，有时两侧稍不等，边缘有明显的齿4—6对，齿宽三角状卵形而有突尖，上面被压平的粗毛，下面较少或沿叶脉和近缘处有毛，有时几无毛。花单生于叶腋，常占茎枝的大部而形成疏总状，仅在茎枝顶端有时叶几全缘而为苞片状；花梗纤细，长10—20毫米；萼仅基部联合，齿5，条形，在果时长可达5毫米，有突起的坚强中肋，肋上及边缘有硬毛，花时开展，果时内弯而包裹蒴果；花冠大，白色或淡紫色，长约7毫米，稍长于萼；上唇短，卵形，下唇较长，伸展；雄蕊4，全育。蒴果纺锤状卵圆形，比萼短。花期5—8月，果期7—11月。

分布于浙江、江西、福建、广东、广西、贵州和四川等省。日本也有。生于山谷、道旁、林中、草地等比较湿润的地方。

14. 黄岑母草

Lindernia scutellariiformis Yamaz. Journ. Jap. Bot. 27: 67. f. 1—4. 1952.—*Vandellia scutellariiformis* (Yamaz.) Yamaz. l. c. 30: 174.
1955.

草本；根须状；茎细弱，长达20—36厘米，基部倾卧蔓延，多分枝，节上生根，面上有沟，有细毛。叶有长约5毫米的短柄；叶片三角状卵形，长1.6—2.5厘米，宽8—15毫米，顶端急尖或微钝，基部宽楔形至亚截形，或亚心形，边缘有6—10对三角形锐头的锯齿，上面无毛，颜色较深，下面沿叶脉毛较多。花序为伸长而稀疏的总状花序，有花6—10朵，花对生。花梗长1—1.8厘米，向上渐短，有极稀疏的毛；苞片条状披针形，长约5毫米，有稀疏的毛；萼钟状，仅基部联合，齿条状披针形，长5—9毫米，顶端渐尖，全缘，外面有稀疏的短毛，有一条明显的中脉；花冠长达13毫米，上唇2裂而狭，下唇3裂，裂片宽卵形，中间较大，比上唇稍长；前方2枚雄蕊花丝基部有棍棒状附属物；柱头片状。蒴果椭圆状矩圆形，比宿萼稍短。

产我国台湾台南县。

15. 江西母草 图版14: 5—8

Lindernia kiangsiensis Tsoong, sp. nov., in Addenda 396.