

分布于河南、湖北、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南等省区。日本,朝鲜南部,越南,老挝,柬埔寨,印度尼西亚(爪哇),缅甸,印度,尼泊尔,斯里兰卡也有。生于海拔 1500 米以下的水田、河流旁等低湿处。

18. 短梗母草 图版 15: 5—6

Lindernia brevipedunculata Migo, Journ. Shanghai Sci. Inst. sect. 3. 4: 160. 1939.—*Vandellia brevipedunculata* (Migo) Yamaz. Journ. Jap. Bot. 30: 175. 1955.


草本,全体无毛;有须状分枝而长达 10 厘米的根;茎细弱倾卧,长可达 30 厘米,极多分枝,铺散,常在节上生根,四角形,枝伸展,又分而倾卧,节间长 2—3 厘米,但向上渐短。叶柄长 3—5 毫米,向上渐短;叶两形,茎和长枝上的叶片卵状椭圆形、披针状矩圆形或倒披针形,长 1.5—2 厘米,宽 0.4—1 厘米,顶端急尖或钝,基部圆形或近心形,有时宽楔形或长渐狭成短柄,边缘有不明显的圆齿,而短枝上的叶则甚小,至少小 2—3 倍。花腋生,成对,在枝端作总状而伸展;花梗细,有棱,长约 6 毫米,向上渐短;萼钟状,仅基部联合,齿条状披针形,长约 5 毫米,直立而稍开展;花冠堇紫色,长 7—8 毫米,二唇形,下唇稍长于上唇;雄蕊 4,二强,着生于喉部,前方 1 对花丝丝状,长约 1.5 毫米,基部有附属物,后方 1 对长 1 毫米,药汇合成对;花柱直立,丝状,端 2 裂;子房卵圆形。蒴果矩圆形或圆柱状矩圆形,比萼长约 1 倍,端锐头,有宿存的花柱。

为我国特有种,仅见浙江昌化县。

19. 长蒴母草(海南植物志) 长果母草(中国高等植物图鉴) 图版 15: 1—4

Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell, Journ. Arn. Arb. 24: 252. 1943; Philcox, Kew Bull. 17: 484. 1964, et 22: 45. p. 10. f. 1—7. 1968; 海南植物志 3: 506. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 29. 图 5471. 1975.—*Ruellia anagallis* Burm. f. Fl. Ind. 135. 1768.—*Gratiola cordifolia* Colsm. Prodr. Desc. Grat. 15. 1793.—*Vandellia cordifolia* (Colsm.) G. Don, Gen. Syst. 4: 549. 1838; Yamaz. Journ. Jap. Bot. 30: 175. 1955.—*Lindernia cordifolia* (Colsm.) Merr. Enum. Born. Pl. 524. 1912; Pennell, Arn. Arb. 24: 252. 1943; Li, Quart. Journ. Taiwan Museum 14: 8. 1961; 广州植物志 598. 1956.—*Vandellia anagallis* (Burm. f.) Yamaz. Journ. Jap. Bot. 30: 176. 1955. p. p. excl. syn.

一年生草本,长 10—40 厘米,根须状;茎始简单,不久即分枝,下部匍匐长蔓,节



1—4. 长蒴母草 *Lindernia anagallis* (Burm. f.) Pennell,
 1. 植株; 2. 花冠展开以示雄蕊; 3. 果和萼; 4. 叶片。5—6. 短梗母草 *Lindernia brevipedunculata* Migo, 5. 植株; 6. 果和萼。7—9. 狭叶母草 *Lindernia angustifolia* (Benth.) Wettst. 7. 小枝; 8. 叶片; 9. 果和萼。(吴影桦绘)