

21. 长匍通泉草

Mazus procumbens Hemsl. ex Forbes et Hemsl. Jour. Linn. Soc. Bot. 26: 182. 1890.

多年生草本,植株包括花萼全被白色柔毛。茎多枝,纤细,坚硬,全部长距离匍匐,长达30—45厘米,简单或具分枝,节间较叶通常短。基生叶少到多数,常早枯落,茎生叶通常对生,具长柄,连柄长约1.5—5厘米,柄长为叶片的1/3至几乎等长,叶片近圆形,肥厚,以茎中部生的较大,边缘有粗圆齿,基部截形或近圆形下延成柄。总状花序全为顶生,伸长达13厘米或更长,花稀疏;花梗纤细,较花长1—2倍;花萼钟状,长约5毫米,萼齿与萼筒近等长或稍长,卵状披针形,顶端急尖;花冠紫色,长10毫米以下。蒴果小,圆球形。花果期5月。

分布于湖北西部。

因未见到标本,以上描述是据原始记载及模式标本照片写成。

组3. 狭叶组——Sect. *Lanceifoliae* Bonati, l. c. 529.

22. 狭叶通泉草

Mazus lanceifolius Hemsl. ex Forbes et Hemsl., Jour. Linn. Soc. Bot. 26: 181. 1890.

多年生草本,高20—30厘米,干时变黑色,全体无毛或很快变为无毛。茎多枝,直立,四方形,纤细。叶以茎生叶为主,全部对生,近于无柄,近基部的叶很小,鳞片状,倒卵状矩圆形,顶端圆钝,其余的叶披针形或狭披针形,近膜质,长6—9厘米,顶端急尖至长渐尖,基部楔形,边缘具稀疏或不明显的细锯齿,下面灰白色稍带粉绿,侧脉少而稀疏。花小而少,约6朵排成纤细,蝎尾状顶生的总状花序;花梗较花短,纤细,苞片小,狭披针形,花萼漏斗状,长6—9毫米,萼齿5,与萼筒等长,披针形,顶端急尖,主脉明显,侧脉不明显;花冠(完全发育的未见)几不超过花萼。蒴果卵圆形,端渐尖。花果期3月。

分布于湖北西部、四川东部。

因未见到标本,以上描述是据原始记载及模式标本照片写成,其亲缘关系留待考订。

22. 野胡麻属——*Dodartia* L.

L., Sp. Pl. 633. 1753.