

21. 长匍通泉草

Mazus procumbens Hemsl. ex Forbes et Hemsl. Jour. Linn. Soc. Bot. 26: 182. 1890.

多年生草本,植株包括花萼全被白色柔毛。茎多枝,纤细,坚硬,全部长距离匍匐,长达30—45厘米,简单或具分枝,节间较叶通常短。基生叶少到多数,常早枯落,茎生叶通常对生,具长柄,连柄长约1.5—5厘米,柄长为叶片的1/3至几乎等长,叶片近圆形,肥厚,以茎中部生的较大,边缘有粗圆齿,基部截形或近圆形下延成柄。总状花序全为顶生,伸长达13厘米或更长,花稀疏;花梗纤细,较花长1—2倍;花萼钟状,长约5毫米,萼齿与萼筒近等长或稍长,卵状披针形,顶端急尖;花冠紫色,长10毫米以下。蒴果小,圆球形。花果期5月。

分布于湖北西部。

因未见到标本,以上描述是据原始记载及模式标本照片写成。

组3. 狭叶组——Sect. *Lanceifoliae* Bonati, l. c. 529.

22. 狭叶通泉草

Mazus lanceifolius Hemsl. ex Forbes et Hemsl., Jour. Linn. Soc. Bot. 26: 181. 1890.

多年生草本,高20—30厘米,干时变黑色,全体无毛或很快变为无毛。茎多枝,直立,四方形,纤细。叶以茎生叶为主,全部对生,近于无柄,近基部的叶很小,鳞片状,倒卵状矩圆形,顶端圆钝,其余的叶披针形或狭披针形,近膜质,长6—9厘米,顶端急尖至长渐尖,基部楔形,边缘具稀疏或不明显的细锯齿,下面灰白色稍带粉绿,侧脉少而稀疏。花小而少,约6朵排成纤细,蝎尾状顶生的总状花序;花梗较花短,纤细,苞片小,狭披针形,花萼漏斗状,长6—9毫米,萼齿5,与萼筒等长,披针形,顶端急尖,主脉明显,侧脉不明显;花冠(完全发育的未见)几不超过花萼。蒴果卵圆形,端渐尖。花果期3月。

分布于湖北西部、四川东部。

因未见到标本,以上描述是据原始记载及模式标本照片写成,其亲缘关系留待考订。

22. 野胡麻属——*Dodartia* L.

L., Sp. Pl. 633. 1753.

多年生草本，直立，茎单一或束生，极多分枝。叶少而小，对生或互生，无柄，条形或为鳞片状，全缘或有疏齿。总状花序生于枝端，花稀疏，单生于苞腋；花萼钟状，宿存，萼齿5；花冠2唇形，花冠筒较唇长，圆筒形，向上稍扩大，上唇短而伸直，端凹入，下唇较上唇长而宽，有两条隆起的褶皱，被毛，3裂，中裂较小，稍突出；雄蕊4枚，2强，着生于花冠筒中上部，无毛，内藏，药室分离而又分；子房2室，花柱线状，稍伸出，柱头头状，端浅2裂。蒴果近圆球形，不明显的开裂，种子多数，稍陷于带肉质的中轴胎座上。

本属仅一种，分布于亚洲西部。

1. 野胡麻 图 52

Dodartia orientalis L. Sp. Pl. 633. 1753; Benth. in DC. Prodr. 10: 376. 1846; 中国高等植物图鉴 4: 19. 图 5451. 1975.

多年生直立草本，高15—50厘米，无毛或幼嫩时疏被柔毛。根粗壮，伸长，长可达20余厘米，带肉质，须根少。茎单一或束生，近基部被棕黄色鳞片，茎从基部起至到顶端，多回分枝，枝伸直，细瘦，具棱角，扫帚状。叶疏生，茎下部的对生或近对生，上部的常互生，宽条形，长1—4厘米，全缘或有疏齿。总状花序顶生，伸长，花常3—7朵，稀疏；花梗短，长0.5—1毫米；花萼近革质，长约4毫米，萼齿宽三角形，近相等；花冠紫色或深紫红色，长1.5—2.5厘米，花冠筒长筒状，上唇短而伸直，卵形，端2浅裂，下唇褶皱密被多细胞腺毛，侧裂片近圆形，中裂片突出，舌状；雄蕊花药紫色，肾形；子房卵圆形，长1.5毫米，花柱伸直，无毛。蒴果圆球形，直径约5毫米，褐色或暗棕褐色，具短尖头；种子卵形，长0.5—0.7毫米，黑色。 花果期5—9月。

分布于我国新疆、内蒙古、甘肃、四川；蒙古人民共和国，苏联，伊朗也有。生海拔800—1400米的多沙的山坡及田野。药用。

23. 小果草属——*Microcarpaea* R. Br.

R. Br. Prod., 435, 1810; Benth. et Hook. f. Gen. Pl.

2: 957. 1876.

匍匐草本。叶对生。花小，单生叶腋。花萼管状钟形，5棱，具5齿；花冠近于钟状，檐部4裂，上唇短而直立，下唇3裂，开展；雄蕊2枚，位于前方。蒴果卵形，略扁，有两条沟槽，室背开裂。种子少数，纺锤状卵形，近于平滑。

单种属，分布于亚洲东南部和南部及大洋洲。

1. 小果草(中国高等植物图鉴) 田基王(广东) 图 53