

本种与呆白菜相似，但叶片全缘，而相区别。标本未见。模式标本采自四川城口。

30. 鞭打绣球属——*Hemiphragma* Wall.

Wall., Tent. Fl. Nep. 17. t. 8. 1822.

铺散状匍匐草本，被柔毛。茎纤细，多纤匐状分枝，节上常生须状不定根。叶2型；茎叶对生，柄短，叶片圆形至卵圆形或肾形，边缘具圆锯齿；枝叶簇生，稠密，针状。花单生于叶腋，无梗或有短梗；花萼5裂至基部，裂片狭窄；花冠白色至玫瑰色，辐射对称，花冠筒短钟状，花冠裂片5，与筒部近等长，圆形至矩圆形，近于相等；雄蕊4，等长，着生于花冠筒基部，花丝丝状与筒部贴生，花药箭形，药室顶端结合；雌蕊短小，长不超过雄蕊，柱头钻状或2叉裂。果实卵圆形至圆球形，近于肉质，红色，有光泽，中纵缝线开裂，果爿全缘或2裂，有时如蒴果整齐开裂为4片；种子多数而小，卵形，光滑。

一种，分布于亚洲亚热带地区。

1. 鞭打绣球 羊膜草 图61

Hemiphragma heterophyllum Wall. Tent. Fl. Nep. 17. t. 8. 1822. in Trans. Linn. Soc. 13: 611. 1822; Benth. in DC. Prodr. 10: 429. 1846; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 289. 1885; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 838. 1936; 中国高等植物图鉴 4: 34. 图 5481. 1975.

多年生铺散匍匐草本，全体被短柔毛。茎纤细，多分枝，节上生根，茎皮薄，老后易于破损剥落。叶2型；主茎上的叶对生，叶柄短，长2—5毫米或有时近于无柄或柄长至10毫米，叶片圆形，心形至肾形，长8—20毫米，顶端钝或渐尖，基部截形，微心形或宽楔形，边缘共有锯齿5—9对，叶脉不明显；分枝上的叶簇生，稠密，针形，长3—5毫米，有时枝顶端的叶稍扩大为条状披针形。花单生叶腋，近于无梗；花萼裂片5近于相等，三角状狭披针形，长3—5毫米；花冠白色至玫瑰色，辐射对称，长约6毫米，花冠裂片5，圆形至矩圆形，近于相等，大而开展，有时上有透明小点；雄蕊4，内藏；花柱长约1毫米，柱头小，不增大，钻状或2叉裂。果实卵球形，红色，长5—6毫米，可达10毫米，近于肉质，有光泽；种子卵形，长不及1毫米，浅棕黄色，光滑。花期4—6月，果期6—8月。

分布于云南、西藏、四川、贵州、湖北、陕西、甘肃及台湾。尼泊尔，印度，菲律宾也有。生于海拔3000—4000米的高山草地或石缝中。

本种是一多变种，尤以叶片的大小，形状，质地，锯齿的多少及茎、枝叶疏密度变