

利亚至南端的云南呈明显的梯度变异 (Cline), 北端的叶全部互生或仅下部的对生, 叶片由北端的条形至最南端的为卵圆形, 过去一些作者把这样的一个梯度变异切成几段, 定为几个种。

细叶婆婆纳(原亚种) 图 71

subsp. *linariifolia*——*V. angustifolia* Fisch. ex Link, Jahrb. Gewachskunde, 3: 35. 1820.

根状茎短。茎直立, 单生, 少 2 支丛生, 常不分枝, 高 30—80 厘米, 通常有白色而多卷曲的柔毛。叶全部互生或下部的对生, 条形至条状长椭圆形, 长 2—6 厘米, 宽 0.2—1 厘米, 下端全缘而中上端边缘有三角状锯齿, 极少整片叶全缘的, 两面无毛或被白色柔毛。总状花序单支或数支复出, 长穗状; 花梗长 2—4 毫米, 被柔毛; 花冠蓝色、紫色, 少白色, 长 5—6 毫米, 筒部长约 2 毫米, 后方裂片卵圆形, 其余 3 枚卵形; 花丝无毛, 伸出花冠。蒴果长 2—3.5 毫米, 宽 2—3.5 毫米。花期 6—9 月。

分布于东北和内蒙古。朝鲜, 日本, 蒙古及苏联东西伯利亚地区也有。生草甸、草地、灌丛及疏林下。

水蔓菁(救荒本草)(植物名实图考), 追风草(河北) 图 72

subsp. *dilatata* (Nakai et Kitagawa) Hong, stat. nov.——var. *dilatata* Nakai et Kitagawa, Rep. First Sci. Exped, Manch. sect. 4. 4: 45. 93. 1936.——*V. jeholensis* Nakai, Journ. Jap. Bot. 19: 162. 1943.——*V. galactites* Hance, Ann. Sci. Nat. 5. 5: 232. 1866.——*V. spicata* auct. non L., Franch. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 2. 6: 104. 1883.

叶几乎完全对生, 至少茎下部的对生, 叶片宽条形至卵圆形, 宽 0.5—2 厘米。

广布于甘肃至云南以东、陕西、山西和河北以南各省区。

叶味甜, 采苗炸熟, 油盐调食(植物名实图考)。亦可药用。

2. 羽叶婆婆纳(中国高等植物图鉴) 图版 30: 7—12

Veronica pinnata L. Mant. Pl. 1: 24. 1767; 中国高等植物图鉴, 4: 728. 1975.——*V. laeta* Kar. et Kir. Bull. Soc. Nat. Mosc. 15: 414. 1842.—*Pseudolysimachion pinnatum* Holub, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 2, 4: 425. 1967.

植株全体被短而向上贴伏的白色曲毛。根木质化。茎多支丛生, 直立或稍外倾, 高 10—40 厘米。叶互生, 狭条形至倒披针形, 长 1—3 厘米, 宽 0.5—5 毫米, 多少镰刀状弯曲, 羽状分裂或仅有锯齿至全部近于全缘, 叶腋常有不发育的分支。总状花序



图 71 细叶婆婆纳(原亚种) *Veronica linariifolia* Pall. ex Link subsp. *linariifolia*,
1. 植株(下部); 2. 植株(上部); 3. 果。(许介眉绘)