

不足以作为分种的理由。

组 4. 蚊母草组——Sect. *Alsinebe* Griseb.

Grissb. Spicil. Fl. Rum. et Bith. 2: 23, 1844. p. p.——sect. *Veronicastrum* Benth. in DC. Prodr. 10: 482. 1846.——sect. *Omphalospora* Bess. Enum. Pl. Vohl. 85. 1821, nomen. p. p.

一年生草本，根细。叶对生，苞片互生，叶状。总状花序顶生或兼有腋生，伸长而疏生花。花萼裂片 4 枚；花冠辐状，筒部极短；雄蕊短于花冠。蒴果通常明显侧扁，少有稍扁的，顶端明显凹缺，带有极短的宿存花柱。种子扁而两面稍臃，平滑。

我国产 4 种。

18. 裂叶婆婆纳(中国高等植物图鉴) 图版 34: 1—5

Veronica verna L. Sp. Pl. 14, 1753; Benth. in DC. Prodr. 10: 483, 1846; 中国高等植物图鉴, 4: 729. 1975.

茎直立，不分枝或中下部有垂直向而紧靠主茎的分枝，高 5—25 厘米，被白色曲毛。叶下部的有短柄，卵形，具圆齿或几乎全缘，早落；中部的无柄，羽状分裂，长 5—12 毫米，宽 4—7 毫米，被短刚毛。总状花序长而多花，呈穗状，花序各部分被腺毛或刚毛；苞片下部的披针形，分裂，上部的条形，全缘；花梗极短；花萼裂片狭披针形，具 3 脉；花冠淡蓝色或蓝紫色，为萼一半长，裂片圆形至卵形；雄蕊短于花冠。蒴果倒心形，几乎扁平，长约 3 毫米，宽近 4 毫米，基部宽楔形或圆形，边缘有腺毛或刚毛，宿存的花柱长不及 1 毫米，几乎与凹口齐。种子数颗，长近 1 毫米。 花期 3—7 月。
 $2n=16$

产新疆(阿尔泰、伊宁)，新疆南部及西藏西部可能也有。欧洲至苏联西伯利亚和中亚地区，伊朗及印度西北部也有。生于旱草地上、桦木林下、路边、田野，海拔 2500 米以下。

V. dillenii Crantz. 与本种极近，不同处在于它的花柱明显超出凹口；蒴果基部浑圆。欧洲至伊朗及苏联中亚和西伯利亚广布，我国新疆北部阿尔泰、塔城、博乐一带极可能有。生于干草原、松林、多石山坡。

19. 蚊母草(本草纲目)(植物学大辞典)，水蓼衣(救荒本草)(植物名实图考) 仙桃草(全国中草药汇编) 图版 33: 7—12

Veronica peregrina L. Sp. Pl. 14, 1753; Benth. in DC. Prodr. 10: 482. 1846; 中国高等植物图鉴, 4: 38. 图 5490. 1975; 江苏南部种子植物手册，



1—5. 裂叶婆婆纳 *Veronica verna* L., 1. 植株体态; 2. 花萼纵剖; 3. 花冠纵剖; 4. 子房及花柱; 5. 蒴果及宿存的花萼。6—8. 红叶婆婆纳 *Veronica ferganica* M. Pop., 6. 植株体态; 7. 蒴果及宿存的花萼; 8. 种子。9—14. 两裂婆婆纳 *Veronica biloba* L., 9. 植株体态; 10. 花; 11. 花萼纵剖; 12. 花冠纵剖; 13. 子房及花柱; 14. 蒴果及宿存的花萼。(刘春荣绘)