

头状或浅2裂。花期5—9月。

分布于云南西北部及四川西南部,海拔3600—4800米的高山草地及砂砾坡地。

革叶兔耳草裂唇变种 图版41: 1—5

var. *rockii* (Li) Tsoong, comb. nov.——*L. rockii* Li, Brittonia 8(1): 27. 1954.

这一变种与前一变种之别在于上唇显著凹缺或2(3)裂;花较大,花冠长约12—15毫米。花期5—7月。

分布于四川西部及云南西北部,海拔3400—5000米的高山草地及多石的坡地上。

10. 云南兔耳草

Lagotis yunnanensis W. W. Smith, Notes Bot. Gard. Edinb. 11: 219. 1919; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 840. 1936.

多年生草本,高约15—35厘米。根状茎伸长,粗壮,长达6厘米;根多数,条形,带肉质,长可达15厘米,直径约1—2毫米。茎单条或2条,直立,较叶长。基生叶4—6片,叶柄长6—10厘米,有翅,基部稍扩大;叶片卵形至矩圆形,纸质,长3.5—7厘米,可达12厘米,顶端圆形或有短锐尖头,基部楔形下延成柄,边缘有宽圆齿,少全缘;茎生叶生于花序附近,2—6片,无柄,与基生叶相似而较小。穗状花序长4—10厘米,直径约2厘米;苞片卵形至卵状披针形,顶端微尖,暗黄绿色,边缘色淡,膜质;花萼在花期时稍超过苞片,佛焰苞状,淡黄绿色,主脉两条稍伸出,边缘常为细流苏状;花冠白色,少紫色,长约8—12毫米,花冠筒伸直,与唇部相等或稍长,上唇矩圆形,全缘,少2裂,下唇2—3(4)裂,裂片披针形;雄蕊2,花丝极短,花药有近于箭形的锐尖头;花柱短,不伸出于花冠筒外;花盘大,斜杯状。花期6—8月。

分布于云南西北部及西藏、四川西北部等地,海拔3350—4700米的高山草地。

11. 箭药兔耳草

Lagotis wardii W. W. Smith, Notes Bot. Gard. Edinb. 11: 218. 1919.

多年生草本,高约12—22厘米。根状茎伸长,中等粗壮;根多数,条形。茎单条,斜升,与叶等长或稍超过。基生叶3—4片,叶柄长3—12厘米,有翅,基部稍扩大;叶片近圆形、倒卵形至卵状矩圆形,长6—12厘米,顶端多圆形,基部截状圆形或宽楔形,边缘有宽圆齿,干时薄纸质,脉近明显;茎生叶生于花序附近,2—5片,具短柄,与茎生叶相似,等大或略较小。穗状花序近球形,开花时伸长,达7厘米;苞片狭披针