

多年生草本，高约10—15厘米。根状茎伸长达7厘米以上，直径约4—7毫米，斜走，肉质，节明显；根多数，条形，长达15厘米，有少数须根。茎1—5条，不分枝，直立或斜升，粗壮，稍超出于叶。基生叶多数，柄粗壮略扁，长4—10厘米，边具薄质窄翅，中部以下常渐鞘状扩大，基部宽达8毫米；叶片宽卵圆形、椭圆形至倒卵形，长约3—4.5厘米，顶端钝，基部宽楔形至截形，边缘具钝齿；茎生叶2—4，生于茎端，有短柄或近于无柄，与基生叶相似而较小，长约2.5厘米。穗状花序卵圆至矩圆形，长约2.5—6厘米，花稠密；苞片宽卵形至倒卵形，较花冠筒短，边缘或上部有锯齿，干时变黑色；花萼佛焰苞状，膜质透明，后方顶端稍浅裂，边缘有啮蚀状小齿，两条主脉旁色深，质较厚，但不伸出成齿状；花冠白色或紫色，长约1—1.2厘米；花冠筒较唇部长2—3倍，粗大，在中部稍弓曲，上唇卵状矩圆形，宽约2毫米，顶端全缘或啮蚀状至浅2裂，下唇与上唇近等长，2裂，裂片卵形；雄蕊2，着生于上下唇分界处，花丝长不到1毫米，花药肾形；子房卵形，花盘大，斜杯状，花柱伸长近达于花冠筒口，柱头2裂。花期6—7月。

分布于西藏西南部(吉隆、聂拉木)，海拔4600—4700米的石堆上。

16. 粗筒兔耳草

Lagotis kongboensis Yamazaki, Journ. Jap. Bot. 46(8): 242. fig. 1. 1—3. pl. 10. 1. 1971.

多年生草本，高6—15厘米。根状茎伸长，粗壮，长约3厘米，直径6—10毫米，斜走，肉质；根条形，长约6厘米，根颈上无宿存的叶鞘。茎1至数支，直立或外倾，超过叶长。基生叶3—7枚，叶柄长2.5—4.5厘米，基部鞘状；叶片椭圆形至矩圆状椭圆形，长2—4厘米，顶端急尖或钝，有短尖头，基部楔形，边缘有5—9枚常为重锯齿的粗齿；茎生叶3—5枚，卵形至宽卵形，远较基生叶小，顶端急尖，边缘有锐齿，无柄或靠下的具短柄。穗状花序长2—3.5厘米；苞片卵形，长6—8毫米，顶端急尖，边缘有3—5枚缺刻状锯齿；花萼佛焰苞状，长5毫米，两条主脉伸出成长1.2毫米披针形的2齿裂，上部边缘被毛；花冠白色或带淡蓝色，长约7毫米，花冠筒长约4毫米，较唇部稍长，粗大，在中部以上稍弓曲，内面被毛；上唇2裂，裂片条形，长约3毫米，宽约0.7毫米，下唇与上唇近等长，2裂，裂片同形但较窄，宽约0.5毫米；雄蕊2，着生于上下唇分界处，花丝极短，花药近开展，较花丝微长；花柱稍伸出花冠筒外，柱头头状。花期8月。

分布于我国西藏东南部、南部，海拔4500—4600米的开旷山腹。

17. 全缘兔耳草(中国高等植物图鉴) 图91