

Lagotis integra W. W. Smith, Notes Bot. Gard. Edinb. 11: 216. 1919; 中国高等植物图鉴 4: 48. 图 5510. 1975.—*L. micrantha* Hand.-Mazz. Sitz.-ber. Akad. Wien 42: 240. 1925.

多年生草本，高 7—30(50) 厘米。根状茎伸长或短缩，肥厚，黄色，长达 6 厘米；根多数，条形，簇生，长可达 16 厘米，直径约 1—2 毫米，有少数须根。茎 1 至数条，直立或外倾，较粗壮，长超过于叶。基生叶多为 4—5 片，可达 7—8 片，具长柄，翅宽，基部扩大成鞘状；叶片卵形至卵状披针形，长 4—11 厘米，顶端渐尖或钝，基部楔形，边全缘或有疏而细不规则的锯齿；茎生叶 3—4 (11) 片，近无柄，较基生叶小得多，全缘或有不明显齿状缺刻。穗状花序长 5—15 厘米；苞片卵形至卵状披针形，全缘，向上渐小，较萼短；花萼大，佛焰苞状，超过花冠筒，膜质，后方顶端短的 2 裂，裂片钝三角形，被细缘毛；花冠浅黄、绿白、少紫色，长 5—6(8) 毫米，花冠筒明显向前弓曲，比唇部长，上唇椭圆形，全缘或顶端微缺，下唇 2 裂，裂片披针形；雄蕊 2 枚，着生于花冠上下唇分界处，花丝极短；花柱内藏。核果圆锥状，长约 5—6 毫米，黑色，含种子 2 颗。

花果期 6—8 月。

分布于云南西北部、四川西部、西藏东部及青海西南部，海拔 3200—4800 米的高山草地及高山针叶林下。根药用作藏黄连。

37. 钟山草属——*Petitmenginia* Bonati

Bonati in Lecomte, Not. Syst. I: 335, 1911, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, 4: 443, 1927.

陆生草本，茎直立。叶近无柄，羽状深裂、不裂而具一二枚小齿至全缘。花单生叶腋或为总状花序；具 2 枚小苞片。花萼钟状，5 裂；花冠小，不明显 2 唇形，上唇伸直，2 裂，下唇较长，3 裂，裂片开展；雄蕊 4 枚，多少 2 强，不伸出，药室分离而稍叉开，基部有凸尖；花柱细长，柱头不明显，尖锐。蒴果短于萼或与之等长，基部圆形，侧扁或为球状，顶端截形或凹缺，4 片裂。种子多数，金字塔形或矩圆形，种皮有网纹。

本属现知有两种，一种产我国江苏南京，另一种产老挝及柬埔寨。

1. 钟山草(中国高等植物图鉴)

Petitmenginia matsumurae Yamazaki, Journ. Jap. Bot. 25: 214, f. 2, 1950.

植株高 40—60 厘米。茎不分枝或有疏枝，密被褐色卷毛。叶互生，条形，无柄，微肉质，顶端急尖，长 1.5—5 厘米，宽 1—2 毫米，有一条中脉，边缘反卷，上面和边