

## 紫葳科——BIGNONIACEAE

乔木、灌木或木质藤本，稀为草本；常具有各式卷须及气生根。叶对生、互生或轮生，单叶或羽叶复叶，稀掌状复叶；顶生小叶或叶轴有时呈卷须状，卷须顶端有时变为钩状或为吸盘而攀援它物；无托叶或具叶状假托叶；叶柄基部或脉腋处常有腺体。花两性，左右对称，通常大而美丽，组成顶生、腋生的聚伞花序、圆锥花序或总状花序或总状式簇生，稀老茎生花（Mayodendrom）；苞片及小苞片存在或早落。花萼钟状、筒状，平截，或具2—5齿，或具钻状腺齿。花冠合瓣，钟状或漏斗状，常二唇形，5裂，裂片覆瓦状或镊合状排列。能育雄蕊通常4枚，具1枚后方退化雄蕊，有时能育雄蕊2枚，具或不具3枚退化雄蕊，稀5枚雄蕊均能育，着生于花冠筒上。花盘存在，环状，肉质。子房上位，2室稀1室，或因隔膜发达而成4室；中轴胎座或侧膜胎座；胚珠多数，叠生；花柱丝状，柱头2唇形。蒴果，室间或室背开裂，形状各异，光滑或具刺，通常下垂，稀为肉质不开裂；隔膜各式，圆柱状、板状增厚，稀为十字形（横切面），与果瓣平行或垂直。种子通常具翅或两端有束毛，薄膜质，极多数，无胚乳。

约120属，650种，广布于热带、亚热带，少数种类延伸到温带，但欧洲、新西兰不产。我国有12属，约35种，南北均产，但大部分种类集中于南方各省区；引进栽培的有16属，19种。中南半岛及我国云南、四川、广西、广东、海南、台湾集中了绝大部分热带种属，而梓属 *Catalpa* Scop. 却分布于东亚及北美，另外，中亚至东亚的特有属角蒿属 *Incarvillea* Juss. 在我国亚热带高山十分发育，占有12种之多。紫葳科的所有成员从热带马来西亚，通过中南半岛及印度次大陆来到我国亚热带高山，在体态上出现了特化现象——草本体态。

本科绝大多数种属都具有鲜艳夺目大而美丽的花朵，以及各式各样奇特的果实形状，在世界各国植物园栽培，为观赏、风景及行道树种，并且为热带理想的遮荫藤架植物。木蝴蝶 *Oroxylum indicum* 的茎、叶、花、种子入药，可治心绞痛。灰楸 *Catalpa fargesii* 为国产优良木材，同时也是理想的造林树种。

### 分属检索表

1. 子房2室；蒴果开裂；种子具翅。
  2. 蒴果室间开裂（族1. 紫葳族 Trib. *Bignoniaceae* Benth. et Hook. f.）。
    3. 1回羽状复叶；藤本或藤状灌木；蒴果线形、椭圆形，扁平；隔膜薄。
      4. 小叶2—5枚；粗大木质藤本。
        5. 顶生小叶变成3裂卷须；花红色；蒴果线形……………1. 炮仗藤属 *Pyrostegia* Presl

5. 顶生小叶正常, 小叶 3—5 枚, 无卷须; 花白色; 蒴果长圆形, 扁平 .....  
 ..... 2. 黑夜白属 *Nyctocalos* Teijsm. et Binn.
4. 小叶 2 枚, 稀单生; 纤细藤本 ..... 3. 猫爪藤属 *Macfadyena* A. DC.
3. 2—3 回羽状复叶; 乔木。
6. 顶生聚伞状大圆锥花序; 花小, 白色; 花冠筒细而长; 蒴果线形 .....  
 ..... 4. 老鸦烟筒花属 *Millingtonia* L. f.
6. 顶生总状花序; 花大, 紫红色; 蒴果大型, 长圆状披针形, 长达 1 米 .....  
 ..... 5. 木蝴蝶属 *Oroxylum* Vent.
2. 蒴果室背开裂 (族 2. 硬骨凌霄族 Trib. *Tecomeae* Endl.).
7. 单叶; 能育雄蕊 2 枚; 种子两端有束毛 ..... 6. 榆属 *Catalpa* Scop.
7. 羽状复叶或掌状复叶; 能育雄蕊 4 枚; 种子具有膜质透明翅。
8. 花萼钟状。
9. 乔木或灌木; 1—3 回羽状复叶。
10. 种子无翅, 扁圆球形; 叶为 2—3 回羽状复叶, 叶轴具翅; 蒴果隔膜膜质 .....  
 ..... 7. 翅叶木属 *Pauldopia* van Steenis
10. 种子具翅; 叶轴通常无翅。
11. 蒴果狭长, 圆柱形、线形或狭长圆形; 叶为 1 回羽状复叶 (菜豆树属有的种具 2 回羽状复叶), 叶轴无翅。
12. 花大型, 花冠直径 1.5—4 厘米; 花萼亦大, 宽 1—2 厘米。
13. 花白色; 果粗圆柱形, 隔膜增厚, 木栓质, 厚而扁平 .....  
 ..... 8. 厚膜树属 *Fernandea* Welw. ex Seem.
13. 花鲜红色; 果细长圆形、扁平, 隔膜木质非木栓质增厚 .....  
 ..... 9. 火焰树属 *Spathodea* Beauv.
12. 花小型, 花冠喉部直径不足 1 厘米; 花萼小, 直径不足 1 厘米。
14. 隔膜圆柱形; 种子完全嵌入下陷的凹穴之中 .....  
 ..... 10. 羽叶楸属 *Stereospermum* Cham.
14. 隔膜压扁成扁柱形; 种子稍微凹陷入隔膜之中 .....  
 ..... 11. 菜豆树属 *Radermachera* Zoll. et Mor.
11. 蒴果不狭长, 呈扁卵圆球形; 叶为奇数 2 回羽状复叶, 小叶多数, 小, 长 6—12 毫米; 花冠蓝色 ..... 16. 蓝花楹属 *Jacaranda* Juss.
9. 藤本或草本。
15. 藤本, 以气生根攀援; 奇数羽状复叶; 花橙红色; 蒴果长圆形 .....  
 ..... 12. 凌霄属 *Campsis* Lour.
15. 一年生至多年生草本, 具茎或无茎; 蒴果长角形 .....  
 ..... 13. 角蒿属 *Incarvillea* Juss.
8. 花萼佛焰苞状。
16. 1 回羽状复叶; 顶生总状花序; 蒴果长圆柱形, 外密被褐色长棉毛, 猫尾状 .....  
 ..... 14. 猫尾木属 *Dolichandrone* (Fenzl) Seem.
16. 2 回羽状复叶; 缩短的总状花序生于老茎上; 蒴果线形, 无毛 .....  
 ..... 15. 火烧花属 *Mayodendron* Kurz
1. 子房 1 室, 具侧膜胎座; 果实不开裂; 种子无翅; 乔木或灌木 (族 3. 葫芦树族 Trib. *Crescentieae* Benth. et Hook. f.)。

17. 叶具指状3小叶或为单叶；花簇生；果实在于老茎上，木瓜状……… 17. **葫芦树属** *Crescentia* L.  
 17. 叶为奇数1回羽状复叶；花组成顶生、下垂的圆锥花序；果实悬挂在树梢顶端下垂的果序轴上，肥硕，粗棒状……… 18. **吊灯树属** *Kigelia* DC.

### 族1. 紫葳族——Trib. Bignonieae Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1027. 1876; Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 209. 1894.

蒴果沿隔膜开裂，隔膜与果瓣平行。多数为藤本，具卷须。

#### 1. 炮仗藤属——*Pyrostegia* Presl

Presl in Abh. Boehm. Ges. 5: 523. 1845; Schum. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 223. 1894; Santisuk et Vidal in Fl. Camb. Laos et Viet. 22: 60. 1985.

攀援木质藤本。叶对生；小叶2—3枚，顶生小叶常变3叉的丝状卷须。顶生圆锥花序。花橙红色，密集成簇。花萼钟状，平截或具5齿。花冠筒状，略弯曲，裂片5，镊合状排列，花期反折。雄蕊4枚，2强，药室平行。花盘环状。子房上位，线形，有胚珠多颗，排成2列或1—3列。蒴果线形，室间开裂，隔膜与果瓣平行，果瓣扁平、薄或稍厚，革质，平滑并有纵肋。种子在隔膜边缘1—3列成覆瓦状排列，具翅。

约5种，产南美洲。我国南方引入栽培一种。

##### 1. 炮仗花(广州植物志) 黄鳝藤(云南新平、玉溪) 图版3: 4—5

**Pyrostegia venusta** (Ker-Gawl.) Miers in Proc. Roy. Hort. Soc. 3: 188. 1863; Back. et Bakh. f. Fl. Java 2: 563. 1965; van Steenis, Fl. Males., ser. 1, 8(2): 184. 1977; Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 3: 138. 1982; Santisuk et Vidal in Fl. Camb. Laos et Viet. 22: 62. 1985——*Bignonia venusta* Ker-Gawl Bot. Reg. tab. 249. 1818.——*Pyrostegia ignea* (Vell.) Presl, Bot. Bemerk. 93. 1845; Schum. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 223. 1894; 广州植物志 606, 图 322. 1956; 海南植物志 3: 530, 图 906. 1974.

藤本，具有3叉丝状卷须。叶对生；小叶2—3枚，卵形，顶端渐尖，基部近圆形，长4—10厘米，宽3—5厘米，上下两面无毛，下面具有极细小分散的腺穴，全缘；叶轴长约2厘米；小叶柄长5—20毫米。圆锥花序着生于侧枝的顶端，长约10—12厘米。花萼钟状，有5小齿。花冠筒状，内面中部有一毛环，基部收缩，橙红色，裂片5，长椭圆形，花蕾时镊合状排列，花开放后反折，边缘被白色短柔毛。雄蕊着生于花冠筒中部，花丝丝状，花药叉