

17. 叶具指状3小叶或为单叶；花簇生；果实在于老茎上，木瓜状……… 17. **葫芦树属** *Crescentia* L.  
 17. 叶为奇数1回羽状复叶；花组成顶生、下垂的圆锥花序；果实悬挂在树梢顶端下垂的果序轴上，肥硕，粗棒状……… 18. **吊灯树属** *Kigelia* DC.

### 族1. 紫葳族——Trib. Bignonieae Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1027. 1876; Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 209. 1894.

蒴果沿隔膜开裂，隔膜与果瓣平行。多数为藤本，具卷须。

#### 1. 炮仗藤属——*Pyrostegia* Presl

Presl in Abh. Boehm. Ges. 5: 523. 1845; Schum. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 223. 1894; Santisuk et Vidal in Fl. Camb. Laos et Viet. 22: 60. 1985.

攀援木质藤本。叶对生；小叶2—3枚，顶生小叶常变3叉的丝状卷须。顶生圆锥花序。花橙红色，密集成簇。花萼钟状，平截或具5齿。花冠筒状，略弯曲，裂片5，镊合状排列，花期反折。雄蕊4枚，2强，药室平行。花盘环状。子房上位，线形，有胚珠多颗，排成2列或1—3列。蒴果线形，室间开裂，隔膜与果瓣平行，果瓣扁平、薄或稍厚，革质，平滑并有纵肋。种子在隔膜边缘1—3列成覆瓦状排列，具翅。

约5种，产南美洲。我国南方引入栽培一种。

##### 1. 炮仗花(广州植物志) 黄鳝藤(云南新平、玉溪) 图版3: 4—5

**Pyrostegia venusta** (Ker-Gawl.) Miers in Proc. Roy. Hort. Soc. 3: 188. 1863; Back. et Bakh. f. Fl. Java 2: 563. 1965; van Steenis, Fl. Males., ser. 1, 8(2): 184. 1977; Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 3: 138. 1982; Santisuk et Vidal in Fl. Camb. Laos et Viet. 22: 62. 1985 — *Bignonia venusta* Ker-Gawl Bot. Reg. tab. 249. 1818. — *Pyrostegia ignea* (Vell.) Presl, Bot. Bemerk. 93. 1845; Schum. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 223. 1894; 广州植物志 606, 图 322. 1956; 海南植物志 3: 530, 图 906. 1974.

藤本，具有3叉丝状卷须。叶对生；小叶2—3枚，卵形，顶端渐尖，基部近圆形，长4—10厘米，宽3—5厘米，上下两面无毛，下面具有极细小分散的腺穴，全缘；叶轴长约2厘米；小叶柄长5—20毫米。圆锥花序着生于侧枝的顶端，长约10—12厘米。花萼钟状，有5小齿。花冠筒状，内面中部有一毛环，基部收缩，橙红色，裂片5，长椭圆形，花蕾时镊合状排列，花开放后反折，边缘被白色短柔毛。雄蕊着生于花冠筒中部，花丝丝状，花药叉

开。子房圆柱形，密被细柔毛，花柱细，柱头舌状扁平，花柱与花丝均伸出花冠筒外。果瓣革质，舟状，内有种子多列，种子具翅，薄膜质。花期长，在云南西双版纳热带植物园可长达半年，通常在1—6月。

原产南美洲巴西，在热带亚洲已广泛作为庭园观赏藤架植物栽培。我国广东（广州）、海南、广西、福建、台湾、云南（昆明、西双版纳）等地均有栽培。多植于庭园建筑物的四周，攀援于凉棚上，初夏红橙色的花朵累累成串，状如鞭炮，故有炮仗花之称。

## 2. 照夜白属——*Nyctocalos* Teijsm. et Binn.

Teijsm. et Binn. in Journ. Bot. Neerl. 1: 366. 1862; Schum. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 219. 1894; Santisuk in Kew Bull. 28: 182. 1973.

藤本，无卷须。叶对生，为1—2回羽状复叶，小叶3—5（—7）枚，全缘。总状花序顶生。花萼钟状，顶端近平截，具有5枚短而尖的小齿。花冠白色，花冠筒极长，细圆筒状，檐部微呈二唇形，裂片5，卵圆形，近等大，开展。雄蕊4—5，微2强，着生于花冠管近顶端，花药叉开，椭圆形，纵裂，顶端有1尾状附属体。花盘垫状。子房短圆柱形，有多列胚珠，花柱丝状，柱头舌状扁平。蒴果长椭圆形，扁平，有宿存的花萼。种子多数，2至多列，扁圆形，具有白色透明的周翅。

约5种，分布于印度东北部、缅甸、泰国、马来西亚、印度尼西亚（爪哇）、菲律宾及我国云南。我国云南产2种。

### 分 种 检 索 表

- 1. 叶1—2回羽状复叶，小叶5—7枚；花冠长9.5—14厘米；雄蕊4枚 ..... 1. 羽叶照夜白 *N. pinnata* van Steenis
- 1. 叶具3小叶；小叶1—3枚；花冠长5—7厘米；雄蕊5枚 ..... 2. 照夜白 *N. brunfelsiiflora* Teijsm. et Binn.

#### 1. 羽叶照夜白 图版 1: 4—6

*Nyctocalos pinnata* van Steenis in Acta Bot. Neerl. 2: 306. 1953; Santisuk in Kew Bull. 28(2): 183. 1973; van Steenis, Fl. Males., ser. 1, 8(2): 125, fig. 3. 1977; 云南植物志 2: 693. 1979.

缠绕木质藤本，长达20米。叶为1回羽状复叶；小叶3—5枚，长椭圆形，长7—10厘米，宽3—4厘米，顶端渐尖，基部圆形至微心形，薄革质，上面亮绿色，下面淡绿色，侧脉6—8对，近边缘处内弯而互相网结，侧生小叶柄长约1厘米，顶生小叶柄长约3厘米。顶



1—3.老鸦烟筒花 *Millingtonia hortensis* L. f.: 1.花枝, 2.雄蕊, 3.花蕾。4—5.炮仗花 *Pyrostegia venusta* (Ker-Gawl.) Miers: 4.花, 5.雄蕊。(李锡畴绘)