

叶的侧生小枝螺旋状散生，不呈二列。叶条形，扁平，排列紧密，列成二列，呈羽状，通常在一个平面上，长约1厘米，宽1毫米，向上逐渐变短。雄球花卵圆形，近无梗，组成圆锥花序状。球果卵圆形。

原产于墨西哥及美国西南部，生于亚热带温暖地区，耐水湿，多生于排水不良的沼泽地上。我国江苏南京引种栽培，生长良好。但由于地理环境的变化，则变成春季开花（原产地花期在秋季）。近来武汉等地也有引种栽培。可作为温暖地带低湿地区的造林树种和园林树种。木材性质及用途与落羽杉同。

3. 池杉（植物分类学报） 池柏（中国树木分类学），沼落羽松（经济植物手册）
图版 70：6—7


Taxodium ascendens Brongn. in Ann. Sci. Nat. 30: 182. 1833; Rehd. Man. Cult. Trees and Shrubs 24. 1927, ed. 2. 49. 1940, et Bibliogr. 42. 1949; Bailey, Cult. Conif. 139. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 52. 1937; Dallimore and Jackson, Handb. Conif. ed. 3. 605. 1948, rev. Harrison, Handb. Conif. and Ginkgo ed. 4. 584. 1966; 郑万钧等, 中国树木学 1: 223. 1961; 郑万钧等, 植物分类学报 13 (4): 72. 图 43. 6—7. 1975.

乔木，在原产地高达25米；树干基部膨大，通常有屈膝状的呼吸根（低湿地生长尤为显著）；树皮褐色，纵裂，成长条片脱落；枝条向上伸展，树冠较窄，呈尖塔形；当年生小枝绿色，细长，通常微向下弯垂，二年生小枝呈褐红色。叶钻形，微内曲，在枝上螺旋状伸展，上部微向外伸展或近直展，下部通常贴近小枝，基部下延，长4—10毫米，基部宽约1毫米，向上渐窄，先端有渐尖的锐尖头，下面有棱脊，上面中脉微隆起，每边有2—4条气孔线。球果圆球形或矩圆状球形，有短梗，向下斜垂，熟时褐黄色，长2—4厘米，径1.8—3厘米；种鳞木质，盾形，中部种鳞高1.5—2厘米；种子不规则三角形，微扁，红褐色，长1.3—1.8厘米，宽0.5—1.1厘米，边缘有锐脊。花期3—4月，球果10月成熟。

原产北美东南部，耐水湿，生于沼泽地区及水湿地上。我国江苏南京、南通和浙江杭州、河南鸡公山、湖北武汉等地有栽培，生长良好，都用为低湿地的造林树种或作庭园树。木材性质和用途与落羽杉相同。

垂枝池杉（栽培变种）（植物分类学报）

cv. ‘Nutans’, Dallimore and Jackson, rev. Harrison, Handb. Conif. and Ginkgo. ed. 4. 584. f. 177 (1). 1966.—*Cupressus disticha* var. *nutans* Ait., Hort. Kew 3: 372. 1789.—*Thuja lineata* Poir. Encycl. Méth. Bot.



1—3. 落羽杉 *Taxodium distichum* (Linn.) Rich. 1. 球果枝； 2. 种鳞顶部； 3. 种鳞侧面。

4—5. 墨西哥落羽杉 *Taxodium mucronatum* Tenore. 4. 侧生短枝及叶； 5. 侧生短枝与叶的一段。

6—7. 池杉 *Taxodium ascendens* Brongn. 6. 小枝及叶； 7. 小枝与叶的一段。(冯晋庸绘)