

钟形，长约2.2厘米，外有短柔毛和腺毛，冠檐裂片5，略不等，短于花冠管3—4倍；雄蕊2强，2药室不等高，基部有白色小尖头；子房和花柱下部有短柔毛。蒴果长18—22毫米，上部具4粒种子，下部实心似细柄状。

产云南（西双版纳、文山）、广东（北江）、广西（容县）。生林下。东喜马拉雅其他国家、印度东北、缅甸、泰国、中南半岛广布。

云南文山用作解热药。

2. 宽叶十万错

Asystasia gangetica (L.) T. Anders. in Thwaites, Enum. Pl. Zeyl.: 235. 1860; et in Journ. Linn. Soc. Bot. 9: 525. 1867; Bremek. in Dansk Botanisk Arkiv. 20 (1): 78. 1961; ibid. 22 (2): 212. 1965. 云南种子植物名录（下册）: 1669. 1984. ——*Justicia gangetica* L.; Amoena, Acad. 4: 299. (1759) ——*Ruellia coromandeliana* Nees in Wall. Pl. AS. Rar. 3: 89. 1832; Ridley, Fl. Mal. Pen. 2: 586. 1923; R. Ben. in Fl. Gen. Indo-Chine 4: 713. 1935.

多年生草本，外倾，叶具叶柄，椭圆形，基部急尖，钝，圆或近心形，几全缘，长3—12厘米，宽1—4（—6）厘米，两面稀疏被短毛，上面钟乳体点状，总状花序顶生，花序轴4棱，棱上被毛，较明显，花偏向一侧。苞片对生，三角形，长5毫米，疏被短毛；小苞片2，似苞片，着生于花梗基部，长2毫米；花梗约长3毫米，无毛；花萼长7毫米，5深裂，仅基部结合，裂片披针形，线形，长5—6毫米，被腺毛。花冠短，约长2.5厘米，略两唇形，外面被疏柔毛；花冠管基部圆柱状，长约12毫米，上唇2裂，裂片三角状卵形，先端略尖，长约5毫米，下唇3裂，裂片长卵形，椭圆形，中裂片长约9毫米，侧裂片7毫米，中裂片两侧自喉部向下有2条褶襞直至花冠筒下部，褶襞密被白色柔毛，并有紫红色斑点；雄蕊4，花丝无毛，每边一长一短，在基部两两结合成对，花药紫色，背着，长圆形，2室不等高，基部具短尖头；花柱约长12毫米，基部被长柔毛，子房约长3毫米，密被长柔毛，具杯状花盘，花盘多少钝圆，5浅裂。蒴果长3厘米，不育部分长15毫米。

产云南（勐腊）、广东（广州）。分布于印度、泰国、中南半岛至马来半岛，现已成为泛热带杂草（据D. J. Mabberley）。叶可食。

我国产的十万错 *Asystasia chelonoides* Nees 和宽叶十万错 *Asystasia gangetica* (L.) T. Anders. 十分相近，仅前者的叶较狭，狭卵形或卵状披针形，后者叶较宽，椭圆形，基部急尖、钝、圆或近心形，很可能是一种，云南标本多属十万错 *Asystasia chelonoides* Nees，而宽叶十万错 *Asystasia gangetica* (L.) T. Anders. 较少见。待标本采得较多，能仔细比较研究后，到底是一种，还是二种，再定。

3. 囊管花（云南种子植物名录）

Asystasia salicifolia Craib. in Kew Bull.: 367. 1918. ——*Asystasia henryi* C. B.