

产江苏(宜兴)、福建(崇安、南靖、建阳、泰宁)、广东(徐闻、阳春)、海南[海口(模式标本产地, 见到模式标本)、琼海、万宁、陵水、保亭、崖县、昌江、白沙]、湖南(桂东、洞口、新宁、武冈)、重庆(南川、奉节)、江西(贵溪、资溪)、贵州(毕节、普安、习水)、云南(临沧、思茅、景东、西畴)。通常生于低海拔地区的沟谷边或林下, 常见。

5. 广西山蓝(广西植物)

Peristrophe guangxiensis H. S. Lo et D. Fang in *Guihaia* **17** (1): 44.1997. 、

草本, 高约30厘米。叶狭椭圆形, 长1.5—5厘米, 宽5—11毫米, 被小缘毛, 两面散生微疏毛, 叶脉和叶柄上被短柔毛。花序生于小枝顶端; 总苞片2, 狭卵形, 长7—12毫米, 先端急尖或稍钝; 花萼5深裂, 裂片长2.5毫米; 花冠红色, 长2.1厘米, 外面除冠管中部之下和上唇近边缘无毛外, 其余被短柔毛, 上唇长约10毫米, 下唇3浅裂, 裂片长约1毫米; 雄蕊2, 药室基部均无距; 子房和花柱无毛。

产广西(上林)。(模式标本未见)

据原文载: 本种与海南山蓝 *Peristrophe floribunda* (Hemsl.) C. Y. Wu et H. S. Lo 近缘, 但后者叶卵形或披针形, 长达9厘米, 宽3.5厘米; 总苞片卵形或披针形, 远较大, 先端渐尖; 花冠外被倒生柔毛。

6. 九头狮子草(植物名实图考) 接长草, 土细辛(植物名实图考) 图版37: 7—10

Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek. In Boissiera **7**: 194.1943; C. F. Hsieh et T. C. Huang in *Taiwania* **19** (1): 22.1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 172.1975.1975; C. Z. Zheng in *Fl. Chejiang*. **6**: 80.f. 6: 103.1993; 湖北植物大全: 506.1993.——*Dianthera japonica* Thunb., *Fl. Jap.* **21**.t. 4.1784.——*Justicia crinita* Thunb. in *Trans. Linn. Soc.* **2**: 338.1794.——*Dicliptera crinita* Nees in DC. *Prodr.* **11**: 485.1847; F. B. Forbes et W. B. Hemsley in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **26**: 248.1890.——*Peristrophe chinensis* Nees in DC. *Prodr.* **11**: 494.1847.——*Dicliptera buergeriana* Miq. *Ann. Mus. Lugd.-Batav.* **2**: 125.1865—1866; Franch. & Saerat. *Enum. Pl. Jap.* **1**: 356.1875; Franch. *Pl. David.* **1**: 230.1884.——*Dicliptera japonica* (Thunb.) Makino in *Bot. Mag. Tok.* **17**: 90.1903; Hand.-Mazz., *Symb. Sin.* **7**: 898.1936.——*Dicliptera uraiensis* Hayata, *Icon. Pl. Form.* **9**: 85.1920.

草本, 高20—50厘米。叶卵状矩圆形, 长5—12厘米, 宽2.5—4厘米, 顶端渐尖或尾尖。基部钝或急尖。花序顶生或腋生于上部叶腋, 由2—8(10)聚伞花序组成, 每个聚伞花序下托以2枚总苞状苞片, 一大一小, 卵形, 几倒卵形, 长1.5—2.5厘米, 宽5—12毫米, 顶端急尖, 基部宽楔形或平截, 全缘, 近无毛, 羽脉明显, 内有1至少数花; 花萼裂片5, 钻形, 长约3毫米; 花冠粉红色至微紫色, 长2.5—3厘米, 外疏

生短柔毛，2唇形，下唇3裂；雄蕊2，花丝细长，伸出，花药被长硬毛，2室叠生，一上一下，线形纵裂。蒴果长1—1.2厘米，疏生短柔毛，开裂时胎座不弹起，上部具4粒种子，下部实心；种子有小疣状突起。

产自河南（伏牛山）、安徽（巢县、歙县、黄山、潜山）、江苏（苏州、无锡、常熟、虞山）、浙江（杭州、绍兴、宁波、天目山、四明山、寿山）、江西（大余云峰山、九江庐山、南丰、瑞金、贵溪、资溪、崇仁、虞南）、福建（崇安、浦城、南平、闽侯）、湖北（利川、长阳、来凤）、广东（怀集、乐昌、乳源、和平、始兴、连平）、广西（凌云、龙胜、三江、全县、桂林）、湖南（永顺、安江、长沙岳麓山、保靖）、重庆（南川）、贵州（毕节、遵义、习水）、云南（红河、文山）。低海拔广布，生路边，草地或林下。日本也有。

药用能解表发汗等。

7. 五指山蓝（海南植物志）

Peristrophe lanceolaria (Roxb.) Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 114.1832. C. B. Clarke in Fl. Brit. Ind. **4**: 555.1885; R. Ben. in H. Lec. Fl. Gen. Indo-Chine **4**: 768.1935; Bremek. in Dansk Bot. Ark. **20**, 1: 81.1961. 海南植物志 **3**: 561.1974. — *Justicia lanceolata* Roxb. Fl. Ind. **1**: 122.1820. — *Clinacanthus nutans* sensu Groff. Ding et Groff in Lingn. Agr. Rev. **3**: 22, 1925. non (Burm. f.) Lindau. 1895.


直立草本，高30—50厘米；枝稍粗壮，无毛，节上缢陷明显。叶披针形或卵状披针形，顶端呈弯弓的尾状渐尖，基部稍偏斜，狭楔形，全缘，长6—12厘米，宽1—4厘米，纸质，通常仅中脉上被柔毛，钟乳体针状，不甚明显，干时上面有时具颗粒状隆起；中脉稍阔，干时背面平扁，侧脉每边6—7条，两面稍隆起；叶柄长1.5—3厘米。头状花序被腺毛，常2或3个聚于顶生或腋生的总花梗上，总苞片2枚，剑形或线状披针形，比萼齿长一倍以上，长10—14毫米，宽1.5—3毫米；萼长约5毫米，裂片长4毫米；花冠淡红色，长约4.3厘米，被柔毛，冠管狭长，为花冠之半，唇片为1/2。雄蕊2，外露，药室矩圆形，一上一下，分离。柱头稍膨大。蒴果长1.4厘米，被柔毛。花期10月。

产海南（琼中五指山）、云南（景洪、勐腊）。生阴湿处，海拔600米。缅甸和泰国、老挝也有分布。

8. 岩观音草（新拟） 岩山蓝（海南植物志）

Peristrophe montana Nees in Wall., Pl. As. Rar. **3**: 113.1832. et in DC. Prodr. **11**: 493.1847. p. p.; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 556.1885; Hemsl in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 248.1890; 海南植物志 **3**: 561.1974.

直立，无毛草本，高约1米。叶狭长圆形或披针形，稀近卵形，顶端长渐尖，基部急尖，稀渐尖，全缘，长4—9（—20）厘米，宽3—5厘米，薄纸质或近膜质，上面常



图版 37 1—5. 狗肝菜 *Dicliptera chinensis* (L.) Juss.: 1. 部分植株, 2. 花, 3. 花冠剖面示雄蕊, 4. 花萼裂片及苞片, 5. 开裂蒴果示片自蒴底弹起。6. 河畔狗肝菜 *D. riparia* Nees: 6. 花粉粒。7—10. 九头狮子草 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek.: 7. 部分植株, 8. 花, 9. 雄蕊示叠生药室呈线形, 10. 蒴果。

(余汉平、李爱莉绘)