

B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 539.1885; Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **26**: 246.1890; Craib in Kew Bull. : 441.1911; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. **10**: 200.1912; Merr. in Sunyatsenia **1**: 37.pl. 13, f. 2.1930; **1**: 180.1938; Hand.-Mass. Symb. Sin. **7**: 899.1936; in Beih. Bot. Centrabl. 56B/3: 455.1937; C. F. Hsieh & T. C. Huang, Fl. Taiwan. ed. 2.4: 665.photo 343.1998. ——*Rostellularia trichochila* Miq. in Journ. Bot. Need. **1**: 118.1861; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 249.1890.in nota. (Miq. 的模式标本采自中国广东)

5a. 爵床 (原变种)

var. *procumbens*

草本，茎基部匍匐，通常有短硬毛，高20—50厘米。叶椭圆形至椭圆状长圆形，长1.5—3.5厘米，宽1.3—2厘米，先端锐尖或钝，基部宽楔形或近圆形，两面常被短硬毛；叶柄短，长3—5毫米，被短硬毛。穗状花序顶生或生上部叶腋，长1—3厘米，宽6—12毫米；苞片1，小苞片2，均披针形，长4—5毫米，有缘毛；花萼裂片4，线形，约与苞片等长，有膜质边缘和缘毛；花冠粉红色，长7毫米，2唇形，下唇3浅裂；雄蕊2，药室不等高，下方1室有距。蒴果长约5毫米，上部具4粒种子，下部实心似柄状。种子表面有瘤状皱纹。

产秦岭以南，东至江苏、台湾，南至广东，海拔1500米以下；西南至云南、西藏(吉隆)，海拔2200—2400米。生于山坡林间草丛中，为习见野草。亚洲南部至澳大利亚广布。

全草入药，治腰背痛、创伤等。本品在东汉前已载入《神农本草经》，但宋代以后很少入官药而沦为草药。

5b. 早田氏爵床 (台湾植物志第二版，1998) (变种) 澎湖爵床 (台湾植物志，1978)

var. *ciliata* (Yamamoto) S. S. Ying in Mem. Coll. Agr. Natl. Taiwan. Univ. **29** (2): 45.1989. ——*Justicia hayatai* Yamamoto Suppl. Icon. Pl. Formosa **2**: 35, f. 25.1926; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **66**: 372.1991. ——*Justicia hayatai* Yamamoto var. *ciliata* Yamamoto ibid. **2**: 35.fig. 22.1926; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **66**: 322.1991. ——*Justicia procumbens* var. *hayatai* (Yamamoto) Ohwi in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo **33**: 86.1953; C. F. Hsieh et C. T. Huang, Fl. Taiwan ed. 2.4: 667.pl. 305.1998. ——*Justicia ciliata* (Yamamoto) C. F. Hsieh & T. C. Huang in Taiwania **19** (1): 21.1974; Fl. Taiwan **4**: 645.pl. 1140.1978. ——*Justicia hayatai* (Yamamoto) S. S. Ying in Mem. Coll. Agr. Natl. Taiwan. Univ. **29** (2): 45.1989.

草本，茎铺散或外倾，密被长硬毛。叶几无柄，多汁，卵形或近圆形，长10—16毫米，宽8—10毫米，顶端钝，基部圆或宽楔形，边全缘，两面密被长硬毛。穗状花序

长约1—2厘米，具总花梗；苞片阔披针形，长4.2—5毫米，宽1.2—5毫米。顶端钝，边缘稍透明，被长纤毛，背面密被长硬毛；小苞片披针形；花萼裂片线状披针形；花冠堇色，长7—9毫米，宽4—5毫米，外面被微柔毛，冠檐2唇形，上唇直立，三角形，下唇到卵形；花丝稀被纤毛；花柱约长5毫米，近基部被纤毛。蒴果顶端稍被微柔毛。（标本未见）

产台湾 [澎湖岛（模式标本产地，见模式标本照片）、屏东鹅銮鼻]。为澎湖岛和恒春半岛海滨特有。

5c. 密毛（澎湖）爵床（台湾植物志）（变种）

var. **hirsuta** (Yamamoto) S. S. Ying in *ibid.* **29** (2): 44. 1989. — *Justicia procumbens* var. *hirsuta* Yamamoto, *Suppl. Icon. Pl. Formos.* **2**: 32. 1926; C. F. Hsieh et T. C. Huang in *Fl. Taiwan.* ed 2. **4**: 667. 1998. — *Justicia hayatae* Yamamoto var. *decumbens* Yamamoto, *ibid.* **2**: 32. 1926.

茎几铺散，上部上升，基部匍匐，节上生根，密被硬毛，茎上部节上叶对生，卵形或披针形或矩圆状披针形，全缘，长1—1.5厘米，宽0.5—1厘米，顶端钝或略尖，基部圆或极钝，两面密被硬毛。苞片和小苞片及萼片密被硬毛。

产台湾澎湖。（据《台湾植物志》第二版，未见标本）。

5d. 狭叶爵床（台湾植物志）（变种）

var. **linearifolia** (Yamamoto) S. S. Ying in *ibid.* **29** (2): 45. 1989. — *Justicia procumbens* var. *linearifolia* Yamamoto, *l. c.* **2**: 33. 1926; C. F. Hsieh & T. C. Huang in *Taiwania* **19** (1): 21. 1974; *Fl. Taiwan.* **4**: 646. 1978; ed 2. **4**: 667. 1998.

叶线形或稀线状披针形，长1—2.5厘米，宽4—5毫米，顶端极尖或渐尖，基部钝或稍楔形，全缘，两面被极稀疏梳柔毛。

产台湾屏东。

此变种可能即两广线叶爵床 *Rostellularia linearifolia* Bremek. subsp. *liankwangensis* H. S. Lo, 因未见台湾标本，暂志于此。

6. 楠苞爵床（云南种子植物名录）

Rostellularia rotundifolia Nees in Wall., *Pl. As. Rar.* **3**: 100. 1832 et in DC. *Prodr.* **11**: 370. 1847; 云南种子植物名录（下册）: 1684. 1984. — *Rostellaria mollissima* Nees in Wall., *PL. As. Rar.* **3**: 101. 1832, p. p.; in DC. *Prodr.* **11**: 371. 1847, p. p. — *Justicia orbiculata* Wall. Cat. 2489. T. Anders. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **9**: 512. 1867. — *Justicia simplex* D. Don, *Prodr. Fl. Nep.* : 118. 1825; C. B. Clarke in *Fl. Brit. Ind.* **4**: 539. 1885; Bermardi in *Candollea* **18**: 247. 1963. non est *R. simplex* Wight; Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **26**: 247. 1890 quoad Yunnan (Anderson ex Kurz). — *Justicia procumbens* var. *simplex* (D. Don) Yamazaki in *Fl. E. Him.*