

长约3毫米，花冠裂片披针形，长约1毫米，顶端钝；雄蕊着生于冠管喉部，伸出冠管外，花药椭圆形，微小；花柱长1.5毫米，柱头2裂，裂片短，极叉开。蒴果扁球形，长和宽均2—3毫米，成熟时顶部室背开裂，内有多数种子；种子微小，种皮平滑。

花、果期7—8月。

产于云南、贵州、海南和台湾等地；生于杂木林内或山坡草地上，有时亦见于石灰岩上。国外分布于印度、尼泊尔、菲律宾、马来西亚和泰国。

54. 伞房花耳草 (广州植物志) 水线草

Hedyotis corymbosa (Linn.) Lam. Tabl. Encycl. 1: 272. 1791; Backer in Backer et Bakh. Fl. Java 2: 285. 1965; Yamazaki in Hara, Fl. E. Him. 309. 1966; 海南植物志 3: 307. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 222, 图 5858, 1975; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan 4: 272. 1978; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Fl. Pl. Nepal 2: 202. 1979; 新华本草纲要 2: 442. 1991. ——*Oldenlandia corymbosa* Linn. Sp. Pl. 119. 1753; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 64. 1880; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 377. 1888; Lév. Cat. Pl. Yunnan 247. 1917; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 146. 1923. ——*Pharaceum incanum* Lour. Fl. Cochinch. 185. 1790, non Linn. ——*O. herbacea* DC. Prodr. 4: 425. 1830; Benth. Fl. Hongk. 151. 1861, (excl. var.) non Linn. ——*O. hurmanniana* G. Don, Gen. Syst. 3: 529. 1834; Miq. Fl. Ind. Bat. 2: 189. 1857.

54a. 伞房花耳草 (原变种)

var. *corymbosa*

一年生柔弱披散草本，高10—40厘米；茎和枝方柱形，无毛或棱上疏被短柔毛，分枝多，直立或蔓生。叶对生，近无柄，膜质，线形，罕有狭披针形，长1—2厘米，宽1—3毫米，顶端短尖，基部楔形，干时边缘背卷，两面略粗糙或上面的中脉上有极稀疏短柔毛；中脉在上面下陷，在下面平坦或微凸；托叶膜质，鞘状，长1—1.5毫米，顶端有数条短刺。花序腋生，伞房花序式排列，有花2—4朵，罕有退化为单花，具纤细如丝、长5—10毫米的总花梗；苞片微小，钻形，长1—1.2毫米；花4数，有纤细、长2—5毫米的花梗；萼管球形，被极稀疏柔毛，基部稍狭，直径1—1.2毫米，萼檐裂片狭三角形，长约1毫米，具缘毛；花冠白色或粉红色，管形，长2.2—2.5毫米，喉部无毛，花冠裂片长圆形，短于冠管；雄蕊生于冠管内，花丝极短，花药内藏，长圆形，长0.6毫米，两端截平；花柱长1.3毫米，中部被疏毛，柱头2裂，裂片略阔，粗糙。蒴果膜质，球形，直径1.2—1.8毫米，有不明显纵棱数条，顶部平，宿存萼檐裂片长1—1.2毫米，成熟时顶部室背开裂；种子每室10粒以上，有棱，种皮平滑，干后深褐色。 花、果期几乎全年。