

侧脉 5—7 对，纤细，在下面稍明显；叶柄长 0.5—3 毫米；托叶三角形，长 3 毫米，基部宽，顶端针状锐尖长 2—2.5 毫米。圆锥状的聚伞花序顶生，长达 5 厘米，宽达 3 厘米，多花，极稠密，被棕褐色柔毛；花有极短的花梗；花萼长约 1.5 毫米，有紧贴的柔毛，萼裂片长约 0.5 毫米；花冠管状，淡红白色，外面无毛，长约 5 毫米，裂片线状长圆形，长约 2.5 毫米，开放时下弯；花药线状披针形，长约 1.4 毫米，伸出；花柱长伸出，柱头 2 裂。蒴果球形，直径约 2 毫米，有短柔毛，顶冠以宿存的萼裂片。花期 11 月，果期翌年 1 月。

产于广西东兰，贵州关岭，云南红河、屏边；生于海拔约 180 米左右的山地林中，常见于山谷溪边。国外分布于越南和老挝。

3. 水金京（台湾）

Wendlandia formosana Cowan in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 16: 247, pl. 232. fig. 7. 1932 et 18: 183. 1934, pro parte; Kanehira, Formos. Trees ed. 2. 688, fig. 644. 1936; How in Sunyatsenia 7 (1—2): 38. 1948; 刘棠瑞, 台湾木本植物图志, 卷下: 1142. 1962; Li, Woody Fl. Taiwan 880, fig. 357. 1963; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan 4: 344, pl. 1032. 1978; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica 21 (3): 283. 1983.

3a. 水金京（原亚种）

subsp. *formosana*

灌木或乔木，高 2—8 米；嫩枝被短柔毛，赤褐色。叶纸质，椭圆形或椭圆状披针形，长 6—14 厘米，宽 2—5 厘米，顶端骤然渐尖或短渐尖，有时短尖，基部渐狭，两面无毛，或仅在下面中脉和侧脉上有微柔毛；侧脉 5—6 对，纤细，弯拱，疏，在下面稍明显；叶柄长 0.7—2.5 厘米，薄被微柔毛或无毛；托叶阔三角形，外面被微柔毛，长约 3.5 毫米，顶端锐尖，直立。圆锥状聚伞花序顶生，扩展，多花，被褐色短柔毛；花小，有或无短花梗；花萼无毛，长约 1.5 毫米，裂片长约 0.5 毫米，边缘有时有短缘毛，顶端稍钝；花冠白色，管状，在冠管近顶部稍扩大，长 5.5—6 毫米，外面无毛，喉部有白色柔毛，冠管长 3.5—4 毫米，裂片长约 2 毫米，开放时外反；花丝长约 0.8 毫米，花药线状披针形，长约 2 毫米，伸出；柱头 2 裂，伸出。蒴果球形，无毛，直径约 2 毫米，顶部有宿存萼裂片。花期 4—7 月，果期 7—8 月。

产于台湾；生于低海拔的山地林中。国外分布于日本琉球群岛。模式标本采自台湾恒春。

木材坚重，纹理密致，为良好的薪炭材；在台湾用作制扁担和手杖。

3b. 短花水金京（亚种）（植物分类学报） 虾飞木（广西上思） 图版 48: 8—

subsp. *breviflora* How in Sunyatsenia 7 (1—2): 38. 1948; W. C. Chen in Acta