

4. 桔子 (本草经) 水横枝、黄果子 (广东), 黄叶下 (福建), 山黄枝 (台湾), 黄栀子, 黄栀, 山栀子, 山栀, 水栀子, 林兰, 越桃, 木丹, 山黄栀

Gardenia jasminoides Ellis in Philos. Trans. **51** (2): 935, t. 23. 1761; Sprague in Kew Bull. 16. 1929; Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. new ser. **24** (2): 367. 1935; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **16**: 321. 1935; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1021. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 1123. 1937; 广州植物志 508. 1956; 刘棠瑞, 台湾木本植物图志, 卷下: 1108. 1962; Li, Woody Fl. Taiwan 852, fig. 343. 1963; Backer et Bakh. Fl. Java **2**: 313. 1965; Ferguson in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **32** (1): 108. 1972; 海南植物志 **3**: 325. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 238, 图 5890. 1975; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 265, pl. 994. 1978; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal **2**: 202. 1979; 云南种子植物名录, 下册: 1253. 1984. ——*G. florida* Linn. Sp. Pl. ed. 2, 305. 1762; Benth. Fl. Hongk. 153. 1861; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 115. 1880; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 382. 1888; E. Pritz. in Bot. Jahrb. **29**: 582. 1901; Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 366. 1915; Hutchins. in Sargent. Pl. Wils. **3**: 401. 1916. ——*G. radicans* Thunb. Fl. Jap. 109. t. 20. 1784; 陈嵘, 中国树木分类学 1124. 1937. ——*G. grandiflora* Lour. Fl. Cochinch. 147. 1790. ——*G. schlechteri* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **10**: 146. 1911 et Fl. Kouy-Tcheou 366. 1915. ——*G. augusta* Merr. Interpr. Rumph. Herb. Amb. 485. 1917. ——*G. jasminoides* Ellis f. *variegata* (Carr.) Nakai, Trees et Shrubs Jap. ed. 2, 519. 1927, syn. nov. ——*G. jasminoides* Ellis f. *ob lanceolata* (Nakai) Nakai, l. c. 520, syn. nov. ——*G. jasminoides* Ellis var. *boninensis* (Nakai) Nakai, l. c. 521, syn. nov. ——*G. jasminoides* Ellis var. *longisepala* (Masam.). Metcalf in Lingnan Sci. Journ. **12** (4): 593. 1933, syn. nov. ——*G. jasminoides* Ellis f. *simpliciflora* (Makino) Makino, Ill. Fl. Nippon 118. 1940, syn. nov. ——*G. jasminoides* Ellis f. *maruba* (Sieb. ex Bl.) Nakai ex Ishii, Engei-Daijiton **2**: 690. 1950, syn. nov. ——*G. jasminoides* Ellis f. *ovalifolia* (Sims) Hara, Enum. Sperm. Jap. **2**: 15. 1952, syn. nov.

4a. 桔子 (原变种) 图版 87: 1—5

var. *jasminoides*

灌木, 高0.3—3米; 嫩枝常被短毛, 枝圆柱形, 灰色。叶对生, 革质, 稀为纸质, 少为3枚轮生, 叶形多样, 通常为长圆状披针形、倒卵状长圆形、倒卵形或椭圆形, 长3—25厘米, 宽1.5—8厘米, 顶端渐尖、骤然长渐尖或短尖而钝, 基部楔形或短尖, 两面常无毛, 上面亮绿, 下面色较暗; 侧脉8—15对, 在下面凸起, 在上面平; 叶柄长0.2—1厘米; 托叶膜质。花芳香, 通常单朵生于枝顶, 花梗长3—5毫米; 萼管倒圆锥