

17. 蔓九节 (中国高等植物图鉴) 拎壁龙、风不动藤 (台湾植物志), 穿根藤 (潮州志), 蜈蚣藤 (海南儋县), 崧筋藤、上树龙 图版 14: 10—14

*Psychotria serpens* Linn. Mant. 204. 1771; DC. Prodr. 4: 519. 1830; Benth. in Hook. Kew Journ. Bot. 4: 198. 1852; Benth. Fl. Hongk. 161. 1861; Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. St. -Petersb. 29: 172. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 387. 1888; Hayata, Ic. Pl. Formos. 2: 97. 1912; Pitard in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 3: 352. 1924; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 287. 1928; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 679, fig. 633. 1936; 广州植物志 516. 1956; Li, Woody Fl. Taiwan 867. 1963; 海南植物志 3: 353. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 266, 图 5946. 1975; 台湾植物志 4: 329. 1978; C. E. Chang in Journ. Phytogeography taxon. 29 (1): 19. 1981. —*P. scandens* Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 193. 1836. —*P. ixoroides* auct. non Bartl. ex DC.; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 176. 1927.

多分枝、攀缘或匍匐藤本, 常以气根攀附于树干或岩石上, 长可达 6 米或更长; 嫩枝稍扁, 无毛或有秕糠状短柔毛, 有细直纹, 老枝圆柱形, 近木质, 攀附枝有一列短而密的气根。叶对生, 纸质或革质, 叶形变化很大, 年幼植株的叶多呈卵形或倒卵形, 年老植株的叶多呈椭圆形、披针形、倒披针形或倒卵状长圆形, 长 0.7—9 厘米, 宽 0.5—3.8 厘米, 顶端短尖、钝或锐渐尖, 基部楔形或稍圆, 边全缘而有时稍反卷, 干时苍绿色或暗红褐色, 下面色较淡, 侧脉 4—10 对, 纤细, 不明显或在下面稍明显; 叶柄长 1—10 毫米, 无毛或有秕糠状短柔毛; 托叶膜质, 短鞘状, 顶端不裂, 长 2—3 毫米, 宽 2—5 毫米, 脱落。聚伞花序顶生, 有时被秕糠状短柔毛, 常三歧分枝, 圆锥状或伞房状, 长 1.5—5 厘米, 宽 1—5.5 厘米, 总花梗长达 3 厘米, 少至多花; 苞片和小苞片线状披针形, 苞片长达 2 毫米, 小苞片长约 0.7 毫米, 常对生; 花梗长 0.5—1.5 毫米; 花萼倒圆锥形, 长约 2.5 毫米, 与花冠外面有时被秕糠状短柔毛, 檐部扩大, 顶端 5 浅裂, 裂片三角形, 长约 0.5 毫米; 花冠白色, 冠管与花冠裂片近等长, 长 1.5—3 毫米, 花冠裂片长圆形, 喉部被白色长柔毛; 花丝长约 1 毫米, 花药长圆形, 长约 0.8 毫米。浆果状核果球形或椭圆形, 具纵棱, 常呈白色, 长 4—7 毫米, 直径 2.5—6 毫米; 果柄长 1.5—5 毫米; 小核背面凸起, 具纵棱, 腹面平而光滑。花期 4—6 月, 果期全年。

产浙江、福建、台湾、广东、香港、海南、广西。生于平地、丘陵、山地、山谷水旁的灌丛或林中, 海拔 70—1360 米。分布于日本、朝鲜、越南、柬埔寨、老挝、泰国。模式标本采于广州。

全株药用, 功能舒筋活络、壮筋骨、祛风止痛、凉血消肿; 治风湿痹痛、坐骨神经痛、痈疮肿毒、咽喉肿痛。



图版 14 . 1—4. 九节 *Psychotria rubra* (Lour.) Poir. 1. 果枝; 2. 花; 3. 花冠展开, 示雄蕊; 4. 果。5—9. 驳骨九节 *P. prainii* Lév.: 5. 果枝; 6. 花萼; 7. 花冠和雄蕊; 8. 花冠展开, 示雄蕊; 9. 果。10—14. 蔓九节 *P. serpens* Linn.: 10. 果枝; 11. 花; 12. 花冠展开, 示雄蕊; 13. 花萼和雌蕊; 14. 果。(余峰绘)